

CATALOGUS
PLANTARUM

IN AGRO CALATA-MIROXENSI COLLECTARUM

AD

EMMANUELE TARANTO ET XAVERIO GERBINO



CATANE

EX TYPOGRAPHIA JOSEPHI MESUMECI-PAPALE

1845.

LECTORI

Inter beatas Siciliae plagas meridiem spectantes, Solum Calata-Hieronis terrarum magnitudine (nam quinquagesimam fere partem totius Insulae comprehendit), amoenitate, fertilitate, coelo purissimo mitissimoque non ultimum, de iis quae ad naturam pertinent parum aut nihil a viatoribus perlustratum est. Praeterea si ubicumque viri doctissimi Sicilienses loca naturalia inveniunt, detectasque divitias patefaciunt, sane decebat, ne in illud Tullii, quod est ante pedes nemo spectat, iacidiissemus et nos, naturalia nostra non amplius ultro contemnere.

Huius sedulo perpensis, ad perquirenda, quae uberrime Solum hocce nostrum praebet, naturalia munera jamdudum totum animum appuli, et juventutem in naturalibus scientiis adiutandam, patriumque decus augendum collectiones zoologicas, mineralogicas, botanicas, quas mihi privata studia, amicitiae sapientum, peregrinationesque porrezere, servandas, sancteque custodiendas, quod diu multumque in votis habui, Musaeum publicum nuper instituire feliciter mihi evenit; quod etiam libris sumptu meo comparatis atque omnibus ad id utilibus, nec non archeologicis tenuitatibus, mihi adhibuit exornare.

Sed quo modo colligenda ea, quae ad varia naturalium studia sunt necessaria, juvenes verbo exemploque edocui; nec eos piguit mecum unâ artem patriam peragrantes, alios mineralia et fossilia quaeque exantlare, alios zoologica omniæ venari, alios phytologica quaecumque decerpere, omnes jucundissimis hinc studiis hilari promptoque animo iuvenire, divitiarumque patrias in patrio Musaeo sensim aggerere.

In botanicis vero investigationibus comes mihi adfuit jamtum, adeoque solertissimus Xaverius Gerbinus, qui invitatus meo perfecte cohaerens Florae Calata-Hieronensi viribus atque nostris, omnino peragendae, parentis Numinae studet et ipse. Pauca tamen de Agro nostro, deque incubrationibus nostris breviter hic dicere mihi liceat.

Plagis duabus constat Ager Calata-Hieronensis, quarum unam concentricam, quia urbem continet dicens, concentricam alteram, quam Hanno-petro etiam vocant, ab urbe millibus xxiv. passuum circiter distitam. Prior, de qua praecipue sermo est, latitudinis borealis sub gradu $37^{\circ} 12'$ extat, nec non $32^{\circ} 8'$ longitudinis ab Insula ferri. Parum mari africano distans, nemora venatui habet aptissima, perjuncundas contralles fontibus rictulisque perennibus contextas, vineis, viridariis, pomariis hinc inde consitas, laetisque campos ad olera ac frugum copiam exuberandam idoneos.

Agri pene totius extentio calcarium tertiarium, alicubi conchyliis intergerimis ab Oceano quasi dudum eromitis subactum, exhibet; abundat vero arenaria in orientali et meridionali tractu, argilla prope et circum urbem, sulphato calcareo marnaque, veluti zona, ad septentrionem. Limine in hoc flumen quod dicitur Templum regionem dividit a collibus Platiae, Herbitaeque protractis, et meridiano memorabile Achales a ramis collium Hyblaeorum ad Casmarnam usque distensis. Ad oras occidentales fastigium Montis Cansariae extat, omni alio clatius, a superficie etenim maris mille circiter passuum se attollit; in devertitate autem septentrionali ejusdem pagus et mons Sancti-Michaelis sunt, terrae plantarum uberrimae.

Hujus Soli loca, eorumque vero paucissima, quantum otii concedita nobis munera permiserunt, ego et comes meus per biennium peragravimus; herbarum, quae prae oculis sponte sese exhibere florentes, nonnullas accurate collegimus. collectas acuta oculorum acie, comparavimus, sedulaeque animadversioni, interdum etiam microscopii ope, ea qua par erat diligentia, subjecimus; ad Phytologorum celebriorum recentiorum libros et consilia irimus; et plantas omnes, quas decerpimus in Herbario Musaei adseravimus.

Quare, benecole Lector, fasciculum primum platarum Calata-Hieronensium lubenter accipe, quem si modo nonnisi nudum Catalogum stationes efflorescentiasque rix signantem inspicias, veluti materiam, licet rudem, inspicias quaeso, quam paulatim congerere nitimur ad opus arduum et difficile florum Calata-Hieronensis, exquisitis prius locis omnibus extruendum; eadem ratione, qua naturalibus quibusque aliis adhuc inventis ac in Solo nostro collectis colligendae, uti speramus, facit Deus, ad totius regionis scientificam descriptionem tandem concinnandam. Vale.

ERNANDEL TARASTUS

DIANDRIA

MONOGYNIA

Olea oleaster Hoffm. — *Olea Europaea* *b. oleaster* *L.*

In sylvaticis, et comoribus satis abunde.

Floret ab idibus aprilis ad idus junii.

Veronica arvensis *L.*

In collibus herbosis, ad rupes et rudera — *Mazzene, Buletanze, s. Bartolomeo.*

A martio ad majum.

— *anagallis* *L.* — var. *b. elata* *Guss.*

In aquis, et ad rivulos frequentissime.

Ab aprilis ad majum.

— *hederacifolia* *L.*

In cultis, et incultis, ad muros et rudera, per vias ubique.

A januario ad aprilum.

— *panormitana* *Tin.*

In ruderalis, ad muros humidiusculos circum olera. *s. Bartolomeo, Gresi, Teatrino* ad compages lapideas. *Martia* et *aprilis.*

Veronica cymbalaria Bertol.

In cultis, incultis, et ruderalis, secus vias, ad muros ubique.

A decembri ad majum floret.

— *didyma* *Ten.*

Ibidem et eodem tempore floret,

— *agrestis* *L.*

In arvis, hortis, et vineis. *Regalerno Orti-de-miracoli, Saracena.*

A februario ad majum.

Rosmarinus officinalis *L.*

In sylvaticis praesertim meridionalibus. *Noce, s. Pietro, Marfau, Piana-di-Carbone, s. Basilis etc.*

Floret fere per totum annum, plene vero ab octobri ad majum.

Salvia clandestina *L.*

Optime congruit cum descriptione *Cl.*

Bianca. Flora de' dintorni di Areola.

In collibus arcosis, et calcareis, ad margines viarum abunde.

A aovenbri ad majum, et ipso humidiusculis ultra.

TRIANDRIA

MONOGYNIA

Valeriana rubra L.—*Centranthus ruber. DC.*

In calcareis lapideis, et ad fissuras rupium. Montagna, Marciniano, s. Pietro et alibi.

Ab aprilis ad augustum plene floret, per annum raro.

Fedia cernucopine Vahl.

In cultis et herbosis, secus vias, et inter vineas satis abunde.

Δ decembris ad junium.

var. *b. floribus albis.*

In herbis ad sepes rara et specie gracilior. 1. *Caterina*, *Tabascio*, *Novara*.

Ineunte vero.

Varianella eriocarpa Desv.

Inter segetes et in pascuis herbosis non rara.

Ab idibus martii ad majum.

Crocus longiflorus Raf.

In collibus arenosis et calcareis, ac in pascuis apricis abunde.

Ab octobri ad decembrem.

Romulea bulbocodium Seb. et Maur.

In arenosis et calcareis in pascuis apricis ad vias. *Portofino*, *Moschella*, *Piana-di-Carbione*, *Battistella*, et alibi copiose.

Δ februario ad novem Martii.

Gladiolus segetum Ait. — *G. infestus Bianc.*

Inter segetes ubique infestus.

Aprilis majo.

Iris pumila L.

In collibus aridis. *Bardella*.

Δ februario ad idus martii.

var. *c. discolor Guss.*

In submontosis calcareis. *Scala*, *Cantaria*.

Martio florentem se nobis exhibuit.

Iris scorpioides Desf.

Δ descriptione Cl. Bertoloni recedit ab corollae lacinias minores horizontales potentes, uti recte monet Cl. Gussone, et majores bifidas ab flores lacte coerulescentes, ab stigmata, licet grandia, fere longitudine segmentorum majorum corollae, sed emarginato-bidentata. Dicendum verum, segmenta majora corollae bifida, lacinialis crosso-serrata.

In collibus apricis, in campis aridis, in lapideis ac ad vias. 1. *Mauvo*, 2. *Maria-di-Geri*, *Portofino*, *Bardella*, *Mazzone*, et alibi non rara.

Δ novembri ad martium.

— **sisyrrinchium L.**

In collibus aridis et sterilibus, ad vias, et ad margines agrorum. *Giuncio*, *Fontanelle*, *Ogliastro*, *Medonna-della-via*, *croc-del-Vicario*, *Cuppuccini*, *Vecchi*, *Rocca* etc.

Δ martio ad majum.

— **tuberosa L.**

In domesticis umbris, et sylvaticis. *Mazzone*, 1. *Basiglio*, *Russa*, 2. *Lozenzo*.

Martio et aprilis.

Cyperus flavescens. L.

In aquis, ad rivulos, et certis agrorum. *Rangasile*, *Locerone*, 1. *Basiglio*.

Δ julio ad septembrem.

— **olivaris Targ.**

In cultis non rarus.

Δ julio ad octobrem.

— **badius Desf.**

In odis, et aquis fere ubique.

Δ majo ad augustum.

Scirpus palustris Presl.

In apusis, ulis, et ad rivales. s.

Pietro, Favare, Granieri.

Ab aprili ad julium.

— *Savii Sebast. et Naur.*

In hamulibus et uliginosis. Ibidem
et s. Basilio, Terrana.

A martio ad octobrem.

Scirpus holoschoenus L.

In demissis humilis. Ibidem, et Ma-

donno-della-via, Saracena, Gioiaco.

A junio ad augustum.

— *maritimus L.*

Ad flumenum ripas. s. Pietro, Terrana,
Mazzarone.

A maio ad augustum.

DICTYNA

Egyplos ovala L.

In campis sterilibus et incultis, ad
margines viarum ubique.

Ab idibus aprilis ad majum.

— *triticoides Regu.*

In arenoso-argillosis aridis ad sepes
herbosos frequens.

Eodem tempore florat.

Rothboella filiformis Roth.

Ibidem.

Ab aprili ad julium.

Lolium perenne L.

In pascuis apricis, in arvis, secus vias
obvium.

Ab aprili ad junium.

var. c. ramosum Guss.

In cultis, inter frumenta, et circum
sterna frequens.

A maio ad junium.

— *arvense L.*

In campis, arvis, et pascuis herbosis,
ac inter segetes.

Ab aprili ad majum.

Gaudinia fragilis Paliss.

In arvis et inter segetes rara.

Majo.

Hordeum murinum L.

In collibus aridis sterilibus, ad vias
et rudera undique.

Aprili majo.

— *bulbosum L.*

Ibidem cum praecedente.

A maio ad junium.

Triticum villosum Paliss.

In arvis et campis aridis, ad vias
biquo.

Majo.

— *repens L.*

In incultis, ad macerietes, ad margines
viarum gramineos.

A junio ad julium.

Catapodium holiaceum Link.

In arenosis herbosis frequens. Por-
tosueto, Moschini, s. Bartolomeo et
alibi.

Majo.

Brachipodium phoenicioides Link.

In collibus calcareo-arenosis. s. Pietro
Canavara.

Majo.

— *sylvaticum Link.*

In dumetis, ad sepes cespitosos, ad
margines agrorum frequens.

A maio ad junium.

Bromus mollis L.

In arvis, in pascuis, inter segetes, ad
vias ubique.

Aprili majo.

— *lanceolatus Roth.*

In agris, arvis, inter segetes abunde.

Ab aprili ad majum.

— *velutinus Schrad.*

In collibus arenosis, ad sepes, et
in campis frequens.

A junio ad julium.

Bromus scoparius L.

In pascuis et collibus herbidis copiosè.

Ab aprili ad majum.

— **Gussonii Parlat.**

In cultis, ad agrorum margines, inter segetes obviæ.

A februario ad majum.

— **madritensis L.**

In aridis, sterilibus, rudentis, ac etiam in pascuis.

Eodem tempore floret.

— **teclorum L.**

Ibidem et ad vias.

Majo.

Festuca ciliata DC.

Cum præcedente.

A martio ad majum.

— **elatior L.**

In demissis piagulis abundat.

Ab idibus aprilis ad majum.

Dactylis glomerata L. - var. b. hispanica Guss.

In aridis et sterilibus, ad margines agrorum, et viarum copiosè.

Aprili majo.

Sclerochloa rigida L. - var. b. muralis Guss.

In cultis et incultis, in rudentis ac etiam ad muros.

Ab aprili ad junium.

Poa annua L.

In rudentis, ad macries circum vias ubique.

A januario ad majum.

— **bulbosa L.**

In pascuis apricis, et herbosis collibus frequens.

A martio ad majum.

— **trivialis L.**

In humidis, ad margines agrorum.
Scuto, Tempore.

laesente majo.

Glyceria ochroleuca Dumor.

In udio, ac juxta rivulos ma. rura. Ibidem.

Ab aprili ad octobrem.

Eragrostis megastachya Link.

Circum olera frequens. Acquis nuova, Ramponde, Bardella.

Septembre floret.

Briza maxima L.

In collibus aridis, in pascuis, ad sepes herbosas, ac inter frequentia abundat.

Majo.

— **virens Reich.**

In herbosis, ad margines agrorum, et inter segetes.

Eodem mense fl.

Chrysurus cynosuroides Pers.

In collibus aridis, in rudentis in testis, ad muros.

A februarii ad martium

Gynosurus echinatus L.

In campis aridis, in herbosis, ad margines agrorum ubique.

Cynodon dactylon Willd.

In cultis et incultis, et præsertim in vineis nihil communis.

Per totam æstatem floret.

Panicum sanguinale L. — Digitaria sanguinalis Presl.

In umidis, ac in aggeribus arenosis. s. Pietra.

Eodem tempore fl.

— **crus-galli L. — Echinochloa crus-galli. Palise.**

var. b. muricum Goss.

In apertis, ad rivulos, ac etiam in nigricosis. Fontenelle, Ramponde, et aliis.

A septembri ad novembrem.

Setaria verticillata Patiss.

In cultis et circum olera. Valle-di-bardella, Ori-dai-Cappuccini, e dei Miracoli etc.

A junio ad septembrem.

Phalaris coerulescens Desf.

In campis, et collibus argillosis frequentes. Pùle, Soccoro, Refugio, Cascalana.

Maje et junio fl.

— *nodosa* Sibth.

Ad margines agrosum, et viarum in aridis.

A maio ad junium.

— *truncata* Guss.

In humetibus. Tempio, Scalo, Fontana-della-pietra.

Maje.

— *quadrivalvis* Lug.

In campis et arvis argillosis. Soccoro, Pùle, Rassa.

Julio et agosto.

— *minor* Retz.

In collibus, campis et arvis argillosis herbosis communis.

Ab aprili ad sanjum.

— *paradoxa* L.

Inter segetes, et in arvis frequens. Ab idibus aprilis ad majum.

Phleum pratense L.

In collibus herbosis apricis non rarum.

Maje.

Polypogon monspeliense Desf.

In convallibus humetibus et ad rivulos. Valle-di-bardella. o di-Rangasile, Ori-dell'-acqua-nuova.

Ab aprili ad junium.

Lagurus ovatus L.

In arenosis aridis ad vias abunde. Maje.

Stipa tortilis Desf.

Cum precedentis.

Aprili.

— *Lagascar* R. S.

Ibidem et eodem mense floret.

Milium multiflorum Cav.

In humidis, in rudertis, ad sepes umbrosas. e. Nuova, e. la Caterina, e. la Maria-di-Gesù et alibi.

A maio ad septembrem.

Gastridium scabrum Presl.

In siccitatibus et aridis, inter segetes. Maje.

Agrostis verticillata Willd.

In humidis, juxta rivulos, et circum fossas. Valle-di-Bardella, Ori-della-Gracia a de'-Miracoli et alibi. Floret fors per totum annum sed precipue a maio ad octobrem.

— *alba* L.

Ibidem et eodem tempore floret.

Arundo ampelodesmos L.

In sylvaticis et submontosis, in collibus ac in nemoribus meridionalibus passim.

Aprili maje.

— *donax* L.

In humidiaculis, in demissis vinearum, et ad margines rivierum potius culta.

A septembri ad octobrem.

— *mauritanica* Desf.

In collibus aridis, ad sepes, ad margines viarum campestris, et ad torrentium altius frequentissime.

A julio ad septembrem.

Koeleria intermedia Guss.

In collibus aridis non rara. Ineunte junio.

Melica ciliata L.

In arenosis, et saxosis, ad sepes.

Ab aprilis ad junium.

Avena Michellii Guss.

Tam in collibus, quam ad torrentium
alveos frequens.

Majo.

— **condensata Link.**

In collibus aridis sterilibus, ad vias
passim.

Ab aprilis ad junium.

— **parviflora Desf.**

In cultis, et inter segetes, et ad mar-
ginem agrorum.

Aprilis majo.

— **sterilis L.**

Ibidem, et eodem tempore floret.

Avena fatua L.

Ibidem locis provenit, et eodem tempe-
re floret.

— **hirsuta L.**

Ibidem ac etiam in ruderalis.

Eodem tempore floret.

Sorghum Halepense Pers.

In sterilibus humilitas infestat vi-
neas.

A julio ad septembrem.

Andropogon hirtum.

In aridis apricis. s. s. Caterina, s. Luigi,
Fontanelli.

A majo ad octobrem.

TRIGYNIA

Polycarpon tetraphyllum L.

In aridis et ruderalis, ad vias. s. s. Ma-

ris-di-Gesù.

Ab aprilis ad julium.

TETRANDRIA

MONOGYNIA

Dipsacus sylvestris Mill.

In argiloso-calcareis humilibus, ad
marginem aquarum lente fluentium.

Bardella, Bagnacile, Mattone, Mad-
dalena etc.

A junio ad augustum.

— **Scabiosa cretica L.**

In collibus calcareis. Cassaria, Co-
ste-dell'-acqua-dolce, Balchioni.

Ab aprilis ad julium.

— **Cupani Guss.**

Ubique ad vias.

A majo ad septembrem et ultra.

Asperula longiflora Wald. et Kit.

In collibus aridis et sterilibus. Ecu-
riales, s. Mauro et alibi.

A julio ad septembrem, aliquo flore
usque ad novembrem.

Sherardia cretica L.

In arvis, collibus, campis, cultis et in-
cultis ac ruderalis herbis obvia.

A februario ad majum.

Galium elongatum Presl.

Adde descriptioni Cl. Gussone, quod
caules sunt tetragoni, superne ra-
mosi, trichotomi.

Ad margines agrorum subhumidos. s. s.
Caterina.

A majo ad augustum.

— **verum L. - var. b. pubescens Guss.**

In humilibus ad margines agrorum
ac etiam in collibus herbosis. Val-
le-di-Bardella, Novara, Pùle.

A junio ad julium.

— **lucidum All.**

In collibus calcareis sylvarum. s. Pie-

bro, Canaria.

Majo.

Galium selaceum L.

In collibus aridis arenoso-calcareis.

Tobascio, Poradiso.

Majo.

— *aparine* L.

var. *δ. minor.*

Ad sepes, in sylvaticis, et ruderalis frequens ambas varietates.

A februario ad aprilum.

— *saccharatum* All.

In saxosis graminosis, inter opuntias, et ad margines agrorum. Mattone, a. Bartolomeo, a. la Caterina.

A februario ad majum.

Rubia peregrina L.

In incolis sylvaticis et dumetis, ac ad sepes.

Majo.

Plantago lanceolata L.—var. *c. lanuginosa*, et var. *d. sericea* Guss.

In incolis et incolitis, ad vias per abunde.

Aprili majo.

— *major* L.

In aquosis, ad rivulos, necus etern,

ad vias humidiores undique.

A majo ad augustum.

— *albicans* L.—var. *δ. angustifolia* Guss.

In arenoso-argillovis, ad margines agrorum. Fontanelle, a. la Caterina.

Aprili majo.

— *Lagopus* L.

In collibus et campis aridis, ad vias passim.

Ab aprili ad majum.

— *serraria* L.

In collibus argilloso-calcareis, ac per vias obvia.

Eodem tempore,

— *Coronopus* L.

Undique ad vias, et in pascuis.

Aprili majo.

— *Psyllium* L.

In collibus et campis aridis graminosis et ad rupes copiose, Giunco, Mattone, a. Bartolomeo, Mattinecchi.

A martio ad majum.

Cornus sanguinea L.

Ad sepes et margines copiosas vinorum, et agrorum. Canaria, et prope a. Nichele.

Majo.

† TETRAGYNIA

Potamogeton fluitans ? Roth.

In aquis stagnantibus rivulorum. Sa-

racena, Ramisone.

Flores non vidimus.

— *crispum* L.

In stagnis. Acqua-nuova.

Junio.

Sagina maritima Don.

In ruderalis, ad muros, per vias.

A februario ad aprilum.

PENTANDRIA

MONOGYNIA

Heliotropium Europaeum L.

In pinguis, finetis, vineis et rud-
eratis obvium.

A junio ad novembrem et ultra.

Myosotis collina Ehrh.

In umbrosis, herbosis, et ad margines
agrorum abunde.

A martio ad majum.

— *Apula* L.

In pratibus, campis, et collibus, ac ad
sepes. *Portosalvo*, s. *Bartolomeo*,
s. *La Caterina*, *Madonna-della-Via*.
A martio ad majum.

Lythospermum purpureo-coeruleum L.

In pratibus siccioribus, in collibus ari-
dis, ad sepes ubique.

A martio ad septembrem.

— *arvense* L.

In cultis et incultis, inter segetes et
vicinae undique.

Ab idibus februarii ad majum.

Anchusa Italica Reiz.

In aridis, ad margines agrorum ac
inter segetes. s. *Luigi*, s. *La Caterina*,
Rocca, *Portosalvo*, *Gianco*.
Ab aprilis ad junium.

Cynoglossum pictum Ait.

In lapideis pinguis et ruderatis.
Rungano, *Battistello*, s. *Basilio*,
Desolate martio usque ad julium.

— *columnae* Ten.

In sterilibus ad vias. s. *La Caterina*.
A martio ad majum.

— *cheirifolium* L.

In collibus et submontosis calcareo-
argillosis, ac inter segetes. *Tabba-
scio*, *Bardella*, *Mazzone*, *Pille*, *Ca-
scadona* etc.
A martio ad aprilis.

Symphytum officinale L.

Ad cursus aquarum et in rivalis
levis fluvibus. *Sarceno*, *Ronga*,
etc. *Norara*, *Mazzone*.

A martio ad majum.

Zeyeri Schimper.

In humilis, et ad rivulos. *Mazzone*,
s. *Bartolomeo*, *Scheggio*.

Aprilis maji.

Cerinthe aspera L.

In agris, campis, vineis, secus vias
herbosas undique.

Ab idibus januarii ad aprilis, et
ultra.

Borago officinalis L.

In cultis, et incultis, ad margines a-
grorum circum olera, et vineas
obvis.

A februario usque ad junium.

Echium plantagineum L.

In aridis submontosis, in campis, et
collibus, secus vias undique.

A martio ad majum.

Species revera polymorpha inven-
imus enim specimina foliis caulibus
ablongo-lanceolatis bracteis linearibus
subulatis, calycis laciniis rec-
tis, corollis plicatis, ciliatis, coeruleis,
concoloribus in collibus apricis.
Mazzecchi, a martio ad majum
Berentia.

Cyclamen Neapolitanum L.

In collibus calcareis, ad fissuras ru-
pium, in sylvaticis. *Montagna*,
Fabascio, *Mazzone*, *Noce*.

A septembri ad novembrem.

Samolus valerandi L.

Ad aquarum sceleratigenas in calcareis.
Montagna.

Junio Serentem vidimus.

Anagallis arvensis L.

In subhumidis cultis, et incultis, ad rudera, ac etiam in collibus aridis non rara.

A martio ad majum.

var. *b. floribus pallidis*

In humilibus. *Bardella, Orti-de' Miracoli—rara.*

Eodem tempore fl.

coerules Schreb.

In cultis et incultis, ruderalis, circum agros, ad sepes herbasas copiosè.

A martio ad majum ac etiam ad junium.

Plumbago Europaea L.

In ruderalis aridis, et ad vias. *s. se*

Maria-di-Gesù, Crece-del-Vicario, s. se

Caterina, Mazzone.

Ab auguste ad octobrem.

Convolvulus sylvestris Willd. et Kit.

Castes in nostro, petioli, ut nervi in foliarum parte inferiore sunt atro rubentes. Praeterea petioli interni sales, et pedunculati bilaterali linea longitudinali sunt signati, ita ut isti subcapites videantur.

In humectis copiosissima. *Valle-di-Bardella.*

Majo junio.

— **arvensis L.**

In arvis, et campis ubique ac ad sepes.

A junio ad octobrem.

— **althaeoides L.**

In collibus calcareis, et marnosis.

Becca, Montagna, Canavaria, Amata.

A majo ad junium.

— **italicus P. S.**

Ad sepes, in dumetis, ad macerietes.

s. Davio, Marfisa, Noce.

Ab aprili ad majum.

Convolvulus cantabrica L.

In arenosis ad vias. *s. Bartolomeo,*

s. se Maria-di-Gesù, Portosanto.

A majo ad septembrem.

Campanula Erinus L.

In ruderalis, rupibus, maris, campis

et ervis ubique.

Ab aprili ad junium.

Viola odoreta L.

In humidiusculis sylvaticis, et ad sepes.

s. Lorenzo, s. Basilio, Russa, Semini,

Valle-di-Saracena, et alibi.

A januario ad martium.

— **arvensis Roth.**

In campis aridis sterilibus, ac etiam ad sepes herbasas, et inter segetes.

Ab idibus februarii ad majum.

Lonicera implexa Ait.

In argillosis, marnosis, et calcareis.

Salvatorella, Fontana-della-pietra,

Scola, Canavaria.

Ab aprili ad majum.

Verbascum sinuatum L.

In arceosis, et calcareis submontosis, ad vias et rudera satis abunde.

A majo ad augustum.

— **repandum Willd.**

In arvis, et campis subargillosis, ac ad vias. *Bardella, Nocera, Piazza-di-*

Carbone et alibi.

A junio ad augustum.

Datura stramonium L.

In ruderalis et pinguibus sylvaticis.

s. Pietro, Oghisatro, Grazia.

A julio ad septembrem.

Hyoscyamus albus L.

Ad rudera, muros, et macerietes in pinguibus. *Ponte-di-Mezzo, Monte-de-*

Miracoli, Reclusario, s. Giovanni.

var. *b. corollis fauce et*

basi atropurpureis, plus

obvia.

Fere per totum annum florescentes.

Hyosciamus niger L.

In pinguibus et in fœtibus, circum
ovilla. Nove, Sette-Frondi,
Aprili maji.

Mandragora officinarum L.

In cultis et incultis aridis, in ru-
deratis, ad vias vulgaris.
A septembri ad octobrem.

Solanum sodomœum L.

Prope flumina ripas, et in humesti-
bus. Campi petro.
Aestate flaret.

— **dulcamara**

In dumetis humidis, sylvaticis humi-
dissecalis, et ad sepes. Valle-di-
bardella, Ori-dell-arquo-nuova,
s. Basile.

Ab aprili ad octobrem usque.

— **moscatum Presl.**

Ad agrorum margines subhumidos, ac
in ruderalis abunde.

Ab aprili ad autumnum.

— **nigrum Willd.**

In pinguibus, fœtibus, ad vias frequens.
Ab aprili ad augmentum.

— **miniatum Berna rdi.**

In demissis humilibus. Bagnole.
Junio florbat.

Lycium Europæum L.

Ad sepes, inter vepres, et in hemo-

ribus satis abunde.

A julio ad septembrem.

Rhamnus Alaternus L.

In nemoribus et in sylvaticis copio-
se. s. Pietro, Granieri, Grozia.
Januario februaria.

Hedera helix L.

Ad muros, in dumetis, ad arborum
truncos passim.
Iocunde autumnæ.

Vitis vinifera-sylvestris Willd.

In sylvaticis. s. Pietro.
Fl. maji? Neanis! fructus vidimus
octobri.

Illecebrum Paronychia L.

In arenosis incultis. Boschigliuolo.
Junio floratum vidimus.

— **tenuiflora Hoffm. et Link.**

In submontosis argillosis - arenosis
meridie spectantibus.
Belmangiare, Abate.

A maja ad julium.

— **ramosissima Pers.**

var. *b.* longe pedunculata.

In humidiusculis apricis. Boschigliuo-
lo, Belmangiare.

A maja ad julium.

Vinca major L.

In humilibus. Valle-di-bardella.
A martio ad majum, ac etiam octobri
et novembri.

DIGYNIA

Ulmus suberosa arborea Willd.

In sylvaticis, et nemoribus, ac etiam
ad sepes, et ambulacra.
Martio.

Herniaria glabra L.

In submontosis. Cameria.
Desigente maja.

Herniaria cinerea D.C. — Polygonum

Calatagironense Cup.

In arvis arenosis, et ruderalis. s. la
Naris-di-Gesù. et aliibi nimis fre-
quens.

Ab aprili ad majum.

Chenopodium melanospermum Spr.

Variat a discipulo. Cl. Gussone longitudo spicarum, quae in nostro sunt 2—3 pollicares.

In fincietis et rudertis ad pascua. Miracoli, Mazzieccchi.

Ab augusto ad septembrem.

— **murale L.**

var. *b. pruinosa*.

Ad margines agrorum pinguium, in fincietis, ad muros, et macerietes ubivium.

A julio ad septembrem.

— **album L.**

In herbosis, et in arvis frequens.

A junio ad septembrem.

— **virile L.**

In arenoso-calcareis. Meschia, Bardella.

Eodem tempore floret.

— **vulvaria L.**

In pinguibus et rudertis sat copiose.

A maio ad septembrem.

— **ambrosioides L.**

In subhumidis argilloso-calcareis, et ad macerietes passim.

A maio ad novembrem.

Beta cicla L.

In collibus herbosis et pascuis apricis abunde.

Ab aprili ad augustum.

Eryngium campestre L.

In cultis et loculis, ac inter segetes post messem.

A julio ad septembrem.

— **triquetrum Vahl.**

In submeiosis, et collibus argillosis abunde. Mutino-a-cento, Portella, s. Riggio, Cascatana, Altorundo.

A maio ad julium.

Bupleurum protractum Link.

In argillosis inter segetes. Martello, Cinace.

Aprili maio.

Bupleurum odontites L.

Falis ramis subjecta sunt polynervia, sed caulium inferiora 3-nervia vel 5—nerviis interalibus margini approximatis.

Ibidem, et alibi non rarum.

Eodem tempore floret.

— **Columnae Guss.**

In campis argillosis, et ad vias frequentes.

Ab augusto ad octobrem.

Ridolfia segetum Moris.

In argillosis inter segetes.

Ab aprili ad junium.

Pimpinella Gussonei Bertol.

In campis arenosis, ad sepes, et marginibus agrorum. Escarinate, Madonna-dello-sia.

A julio ad septembrem.

Ammi Visnaga-b.lejospermum Guss.

In pinguibus argillosis. Ponte-di-mazzo, Martello, Palle.

A julio ad septembrem.

— **majus L.**

In collibus aridis, ac in cultis ubique.

A maio ad julium.

Sium angustifolium L.

In aquosis, et ad rivulos. Rangasile, Saracena, Novara, Mazzone et alibi.

Majo et junio.

Ptychois verticillata D.C.

In pascuis apricis in collibus aridis, in campis siccioribus, ad vias.

Aprili et maio.

Foeniculum vulgare Gaert et D.C.

In collibus herbidis, et arenosis communis.

Junio et julio.

Brignolia platinacaeolia Bertol.

In campis, et arvis calcareis et argillosis. Balatasse, Piana-di-Carbone, Saracena, Argoleme, et alibi.

Majo et junio.

Conium maculatum L.

In pinguibus loculis, et ruderalis, circum arilla. s. *Pietro, Cassaria,*

Marfise, Boschicello.

Majo et junio.

Daucus carota L. — var. b. polygamas Guss.

In campis pinguibus, in arvis, et ruderalis non rara. *Maricello, et alibi.*

Maja.

— **aureus Desf.**

In argillis, inter segetes copiosè.

Majo.

Scandix pecten L.

Inter segetes, ad viarum et agrorum margines abrium.

A martio ad majum.

Smyrniolum perfoliatum Mill.

In pinguibus, in ruderalis et in syl-

vaticis. *Semini, s. la Caterina, Gallo,*

Saracena, et alibi.

Ab aprilis ad iusium.

Tordylium apulum L.

In collis et iaculis, ac inter segetes nihil communius.

Ab idibus martii ad majum.

Opopanax Chironium Kock. et D. C.

In sylvaticis, in dumetis, ad maceriem frequens.

Maja et junio

Ferula communis L.

In sylvaticis septentrionalibus non rara. *Olivo, Mogazzinaccio, Cusumano, Rahaginesi-et-Fallone-dell'Aquila.*

Maja.

Angelica nemorosa Ten.

In specu stalactica aquam calcariferam a farnicibus stillante. *Cassaria, Grotta-delle-Minelle prope s. Michele.*

Septembri florentem collegimus.

TRIGYNIA

Rhus coriaria L.

In collibus sylvaticis arenosis et calcareis, ad sepes, ac ad sinuos rupium, undique.

Majo junio.

Sambucus Ebulus L.

Iuxta torrentium, et fluvium ripas. *Tempio. Junio.*

Tamarix Africana Desf.

In odia, in aggeribus, ad torrentium alveos, ad praerupta argillosa impedienda. s. *Gioranni, s. Pietro, Gramere, Piana-delle-Bruche.*

Ab aprilis ad majum.

PENTAGYNIA

Linum strictum L. — var. c. spicatum Pers.

In submontosis, et collibus calcareis aridis. *Belmonte, Cappucci-accchi. Majo.*

Crassula rubens L.

In collibus aridis, in ruderalis, ad mures frequens.

Majo.

HEXANDRIA

MONOGYNIA

Leucojum autumnale L.

In gyprosis, et calcareo-marmoris. *Rocca, Montagna.*
Incosto calummo.

Narcissus Tazzetta. L.

In humidis marmoris et sylvaticis herbosis. *Falzone-di-sa-Chiera.*
Mario floreotem collegiosus.

— *Cupanianus Guss.*

Ad vias, in aridis ubique.
A septembri ad octobrem.

Album nigrum L.

In calcareo-argillosis inter segetes frequas. *Refugio, Scula, Palla et alibi.*
Majo.

— *roseum L.*

In collibus apricis, in cultis, inter segetes.

Aprilis et majo.

— *neapolitanum Cyr.*

In cultis calcareo-argillosis, et ad rudera. *Mattierecchi, Giances.*

A martio ad majum.

— *trifoliatum Cyr.*

Pileo congruit cum descriptione Cl. Gussone, sed addo quod in nostro corollinum petalo persaepe sunt septem, totidemque stamina.

In argillosis-calcareis, inter segetes non rarum. *Orti-de-miracoli, Mulino, Rosse, Casulana etc.*

Aprilis et majo.

— *Chamaemoly L.*

In aridis cespitosas, et sterilibus, ad rupes, et vias copiose. *Balestasse, Peradillo, s. Bartolomeo, Mattione, etc.*
Decembri et januario.

Allium ampeloprasum L.

In collibus aridis incolitis. s. *Mauve.*
Aprilis et majo.

— *descendens L.*

Ibidem et eodem tempore floret.

— *tenuiflorum Ten.*

In collibus aridis, ac in ruderalis. *Casselle.*

A majo ad julium.

Lilium candidum L.

Nunc spontaneum ad ambolacra in cultis.

Majo et junio.

Ornithogalum collium Guss.

In areosis et calcareis, ad sepes, et circum vineas, ad vias herbidas, et in sylvaticis, undique.

A martio ad majum.

— *narbonense L.*

In cultis argillosis submontensis ac inter segetes. *Muluna.*

Aprilis majo.

Scilla maritima L. - var. a. magna radice rubra Cup.

In calcareis et argillosis, ad viarum margines sylvaticos. s. *Mauve, Salestarello, Valle-di-Piave, Battistella et alibi.*

Ab augusto ad octobrem.

— *intermedia Guss.*

Cum praecedente.

Septembri et octobri floret.

— *Hyacinthoides L.*

In cultis apricis. *Regolarino, Cendarelle.*

Aprilis et majo.

Hyacinthus romanus L.

In cultis et incolitis areosis, ac

inter segetes obvium.

A martio ad novam maji.

Hyacinthus dubius Guss.

In aridis secus vias, ac etiam quandoque inter segetes.

s. *la Caterina*, s. *Bartolomeo*, *Mazzeno*, *Seminio*, *Battistella*, etc.

April.

Muscari comosum Willd.

In arenosis, et argillosis inter segetes et ad margines agrorum copiosissimè.

Aprilis et maio.

— **moscatum var. *δ*. floribus luteis Guss.**

In campis pinguibus apricis rarum. s. *Bartolomeo*.

A martio ad idus aprilis.

— **commutatum Guss.**

In arenosis cultis, et incultis, ac inter segetes ubique.

Martio et aprilis.

— **neglectum Guss.**

Cum precedente, et eodem tempore flori.

— **racemosum Willd.**

In incultis inter opuntias. *Bardella*. Martio, et aprilis.

— **parviflorum Desf.**

In arenoso-calcaris sterilibus. *Boschignuolo*, *Salatino*, *Piana-di-Carbone*, s. *Bartolomeo*, et alibi.

A septembri ad octobrem.

— **cupanianum Nobis.**

Racemo elongato, densifloro, cylindrico, corollis clausis, adpressis, pedunculis inferis brevissimis, superis nullis, foliis latè scape duplo longioribus.

Icon. Cup. Pamph. Sic. 2 tav. 157. Hysalothus botrioides major tubulis variis erectis=Bonsani tav. 22. =Muscari, tubulis erectis, major.

Scapus 10—14 poll. erectus. Folia lacte virentia, 1 poll. cietera lata, scape duplo longiora. Racemus densiflorus, 4—6 poll. longus cylindricus. Flores inferiori lacinisculi. Pedunculi semi-lineares, albi bracteola setacea suffulti. Corollae distinctae, clausae, adpressae, atro-coeruleae, 2—3 lin. longae, inferiores subsessiles, summae sessiles.

Corollis clausis, et adpressis valde differt a *M. moscato* Willd. a *M. maritimo* Desf. et a *M. comoso* Willd. a quibus duobus etiam, et a *M. commutato* Guss. recedit foliis latioribus, et longioribus. Praeterea ab illadem (excluso *M. maritimo*) distinguitur ob flores superos sessiles, inferos subsessiles. Denique racemi aut multo plus elongati quam in *M. commutato*, et non lutei, nec paniculati sicut in *M. moscato*.

Cl. Gussone, cui specimen crassitum communicavimus, non literis manui de ipsis per haec verba = *S. a. c. pulchra et revera nova, cujus icon adhuc dubia*, priusquam vestram speciem viderem, erat in Cup. pamph. 2 tav. 157 et Bon. tav. 22. An inadvertendum vero quod in tabulis Cup. et Bon. pedunculi sunt nostro longiores, et folia breviora.

In arenosis incultis inter opuntias.

— *Bardella* sat rara, nec alibi adhuc vidimus.

Aprilis florentem collegimus.

Asphodelus ramosus. L.

In aridis submontosis, sylvestris, ad sepes ubique, plaga praesertim meridionali.

A februario ad majum.

Asphodelus fistulosus L.

In collibus marnosis, et demissis
gypsaceis. *Rocen.*

A mari ad julum et ultra.

— *luteus* L.

In rupibus et collibus calcareis syl-
vaticis. *Belladonna, Salto, Baldo.*

Aprili et maio.

Agave Americana L.

Ubique sepi arva, et agros.

A junio ad augustum.

Asparagus albus L.

In arenoso-calcareis sylvaticis, et
ad sepes. *Pizzo-di-Carlone, s. Namo-*

ro, Bettistella, s. Pietro, et alibi.

A septembri ad decembrem.

Asparagus acutifolius L.

Ad sepes in sylvaticis et conpitosia
ubique.

Ab augusto ad octobrem.

— *horridus* L.

In sylvaticis arenoso-calcareis, et ad
sepes frequent.

Ab aprili ad junium.

Juncus acutus L.

In udis argillosis. *s. Pietro, Valle-*

di-Nicci.

Ab aprili ad junium.

— *conglomeratus*

In humidiusculis ad vias.

Ab aprili ad junium.

TRIGYNIA

Rumex patientia L.

In humidis demissis, ad aquas lente

fluentes, ad rivulos abunde.

Ab aprili ad junium.

— *conglomeratus* Murr.

In humidis, et sylvaticis.

Junio julio.

— *acephalophorus* L.

In cultis et in campis aridis arenosis
vulgaris.

A februarii ad majum.

— *pseudo-acetosa* Bertol.

In vinctis et collibus calcareo-argillo-
sis frequens. *Regalense, Solvaggio,*

Saraceno.

Aprili et maio.

Rumex multifidus L.

In collibus, et campis micioribus,
haud rare.

Majo et junio.

Colchicum Cupani Guss.

Ad margines viarum in sylvaticis.

Kanposse, Balotasse.

A septembri ad novembrem.

— *Bivonae* Guss.

In collibus apricis. *Consarria.*

Eodem tempore floret.

POLYGYNIA

Alyssa plantago L.

Bene congruit cum descriptione Cf.

Folliebü, exceptis dimensionibus
foliorum, quae in nostra subdu-

plo majora sunt.

In stagnis, et paludibus. *Saraceno.*

A mari ad julum.

OCTANDRIA

MONOGYNIA

Epilobium hirsutum L.

Ad aquarum lente fluentium margines.

Saracena, Ranganate.

Julio et agosto.

— *tenuifolium* L.

In aridis saxosis. *Mazzeccchi.*

A junio ad augustum,

— *pubescens* Roth. - var. *b. latifolium* Guss.

Variet a descriptione Cl. Gussone exacte elatere 4—6 pedali, infera simplici, superna ramosissima, reliqua ut in Guss. sed addo quod calycis lacinae sunt apice rufescentes, cetero pariter rubente.

In demissis humantibus. *Orti-di-Bardella, e d'ell'acqua-nuova, Russa.*

Julio et agosto florentem vidimus, et collegimus.

— *lanceolatum* Sebast. et Maur.

Recedit a descriptione Cl. Gussone stigmate clavato.

Ad aquarum scaturigines. *Valle-di-Bardella.*

A maio ad julium.

— *palustre* L.

In aquis, et ad stagna. *Ranganate, Regalene. Junio.*

Epilobium tetragonum L.

A descriptione Cl. Gussone recedit foliis latioribus, et petalis longioribus.

In demissis humidis. *Valle-di-Bardella, Orti-dell'acqua-nuova.*

Majo et junio.

— *obscurum* Schreb.

Ibidem.

Junio et julio.

Chlora intermedia Ten.

In lapides et ruderas ad vias.

Majo et junio.

Erica arborea L.

In sylvestricis, et nemoribus. a. *Petra, Granieri, Grazia.*

A februario ad martium.

— *peduncularis* Presl.

In calcareis marosis, ad fissuras rupium. *Montagna.*

A septembri ad novembrem.

Daphne Gnidium L.

In sylvestricis submontosis, in collibus caespitosis, ad vias. a. *Neuro, Tabascio, Battistella, Sfere, et alibi frequenter.*

A julio ad septembrem.

TRIGYNIA

Polygonum aviculare L. — var. *erectum*.

In cultis, et incultis, ad vias passim.

A maio ad octobrem.

— *Bellardi* All.

In campis, arvis, et inter segetes. s.

Bartolomeo, Piana-di-Carbene, Piana-del-Conte.

Aprili et maio.

Polygonum convolvulus L.

In cultis, et incultis, ad sepes, et in arvis, ubique.

A maio ad septembrem.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA

- Laurus nobilis L.* A jancario ad apellum.
In sylvaticis raro, aliâ potius culta.

DECANDRIA

MONOGYNIA

- Anagyris foetida L.* ruderalis, ad vias. s. Bartolomeo,
s. Maria-di-Gesù, Semin.
In sylvaticis arcaeo-calcareis, et
ad sepes. s. Mauro, Boechiello,
s. Basilio, Ogliastra, Casarria.
A mayo ad octobrem.
Arbutus unedo L.
In nemoribus. s. Pietro? sed rara;
aliâ olim culta.
Tribulus terrestris L. Ab octabri ad decembrem.
In collibus, et campis aridis, in

DIGYNIA

- Gypsophyla Acrostich Guss.* *Saponaria officinalis L.*
In collibus gypsaceis, et marne-
calcareis. Rocca, Marcimino,
Montagna.
Ad sepes, et margines agrorum in
subhumilis. Fontanelle, s. Cater-
ria, Mazzone, Rungia.
A junio ad augustum.
A mayo ad octobrem.
— *permixta Guss.* *Dianthus velutinus Guss.*
In lapideis calcareis, et in campis
aridis.
In arcaeo, et sterilibus, o-1 vias.
A-1 aprili ad julium.
— *rigida L. ex Guss.* *Siculus Presl.*
In aridis, et sterilibus, o-1 vias.
Advertendum quod caules in hoc
specimen suis multiter, et la-
ferat obsolete quadranguli.
In collibus calcareo-arenosis. Escu-
riales, s. Mauro, s. Brigidia.
Eodem tempore foret.

TRIGYNIA

- Silene gallica L.* *Silene neglecta Ten.*
In arcaeo in campis, et viciis,
ad vias frequent.
In ruderalis, aridis, et ad muros
obvia.
Aprili et mayo. A martio ad aprilum.



Silene sericea *Al.*

var. *a.* et *b.* *Guss.*

Nihil vulgaris in arenosis cultis et iaculis.

A februario ad majum.

- inflata *b.* angustifolia *D. C.*

In arvis, campis, ruderalis, inter segetes, ad meros obvia.

Ab aprili ad julium.

- tenuiflora *Guss.*

In cultis arceosis. s. sa *Mario-di-Grob.*

Ab aprili ad majum.

- italica *Perr.*

Adde descript. Cl. Gussone quod caules superne ovali exquirit viscosi.

In collibus aridis. *Sirene-a.-Luigi.*

Eodem tempore floret.

- fruticosa *L.*

In castra oervi in lacinias calycinis terminati sunt purpurascetes, coetera ut in descriptione Cl. Gussone, sed adde quod folia sunt recta adpressa, connata; florum racemi oppositi et caulos purpurascetes.

In rudemis rara.

Ineunte junio collegimus.

- conica *L.*

In arenosis, aridis, ad vias.

Aprili et majo.

var. *b.* calycinis nervis purpurascens *N.*

In declivitatibus humilibus ad equilonem spectantibus. *Canseria-verao-a.-Michele.*

Majo.

Silene viridiflora *L.*

Ibidem, et eodem mense?

Stellaria media *Smith.* — var. *b.* media.

In rudemis, in cultis, ad sepes, et vias communis.

Floret per totum annum.

Arenaria serpyllifolia *L.*

In muris, rudemis, collibus sterilibus frequens.

Aprili et majo.

- heterosperma *Guss.*

Differt a descriptione Cl. auctoris ob numerum staminum, quae in nostra sunt decem, ob viriditatem caulis, et ob stipulas breviter acuminatas. Semina vero non vidimus.

In rudemis aridis et in arceosis herbosis.

Eodem tempore.

- rubra *Vahl.*

Ibidem et eodem tempore floret.

PENTAGYNIA

Lychnis divaricata *Reich.*

Ad sepes, et in iaculis. *Canseria.*

A majo ad . . .

- coelirosa *D. C.*

In arenoso-calcareis, inter fruticetas et apuntias. *Fonsaville, s. sa Mario-di-Grob.*

- Githago *Scop.*

Inter segetes. *Belmonte, s. sa Caterina, Giunco, Fontanelle, et*

alibi, copiose.

Ab aprili ad junium.

Cerastium glomeratum *Thuit.*

In arenoso-argillosis cultis, et herbosis passim.

A januario ad aprem.

var. *b.* eglandulosum, non viscosum, calycibus concoloribus, *Guss.*

- In cultis, et incultis obvium.
Eodem tempore.
- Cerastium densiflorum Guss.**
In aridis sterilibus siccis raram.
laevo vero.
- **pentandrum L.**— var. **elatum.**
In ruderalis, et in campis aridis
frequens.
- A februario ad aprillem.
- **campanulatum Viv.**
In arvis sterilibus, et campis aridis.
A januario ad martium
- **arenarium Ten.**— var. **b. du-**
bium Guss.
Ad rudera et vias, in campis, et
agris, huc illic abunde.
- A februario ad aprillem.
- Cotyledon umbilicus L.**
In ruderalis, ad muros, in tectis,
et in herbidis muscosis humen-
tibus ubi communis.

- Aprilis et Majo.
- Sedum stellatum. L.**
In tectis, et ruderalis humiditas-
lis frequens.
- Majo.
- **glanduliferum Guss.**
In maris et tectis ubique.
Eodem mense.
- **coeruleum Vahl.**
In rupibus calcareis, *Scelopio.*
Majo.
- **eriocarpum Sibth.**
In montosis calcareis, in rupibus.
Canseria.
Majo et junio.
- Oxalis corniculata L.**
In cultis ad ambulacra. *Portanza, s.*
Lorenzo, forte olim culta.
A februario ad novembrem.

DODECANDRIA

MONOGYNIA

- Portulaca oleracea L.**
In pinguibus, ruderalis, et circum
olera abunde.
- A majo ad augustum.
- Lythrum salicaria L.**
Ad rivulos, et in aquosis. *Valle di-*
Rangate, di-Saracena, di-Bar-
della, et alibi.
Ab augusto ad octobrem.
- **Preslii Guss.**
In argillosis demissis humestibus.
- Al-ponte-vecchio-delle-salange-del-*
mulino-a-rento.
Majo et junio.
- Lythrum Graefferi Ten.**
In humidis, ad aquas lente fluen-
tes. *Marcimino, Saracena, Ran-*
guate etc.
A majo ad septembrem.
- **hyssoipifolia L.**
In humidis. *Saracena, Rangate,*
Marcimino.
Aprilis et majo.

DIGYNIA

- Agrimonia eupatoria L.**
In collibus, et submoestosis cespiti-
osis, ac etiam in demissis syl-
- vaticis, et ad sepes frequens.
A majo ad octobrem.

Reseda crispata L.

In collibus, et campis arenoso-calcareis, in arvis, et ad vias.
Madonna-della-Via, Coppaccini-
erchi, Savini.

Ab aprili ad junium.

— **luteola L.**

Cum praecedente haud rara.
Eodem tempore floret.

— **lutea L.**

In collibus aridis calcareis et argil-
lois. Pagliara, s. te Caterina,
Soccorso, Russo, et alibi.

A junio ad augustum.

— **fruticulosa L.**

In arenoso-calcareis, in rudentis,
ad sepes, et muris dirutos, et
secus vias abunde.

Floret fere per totum annum
praeteritum a martio ad octo-
brem.

Euphorbia Chamaesyce L.

In cultis, et incultis non rara.
Estate floret.

— **perfoliata L.**

In cultis, et ad sepes herbasas fre-
quentes.

A decembri ad aprillem.

— **falcata L.**

In cultis vulgaris.
Aprili et maio.

— **exigua L.**

In arvis, et collibus aridis. s.
Mauro, Maluna.
Eodem tempore.

— **Terracina L.—Neapolitana Ten.**

Species roraria proteiformis. In nostro
specimine duo rami ex eodem
caulo tracti mirum prodeunt varietatem:
eum umbella trifida, et tria
intervalla spectantur in uno, dum
penultima umbella, et quatuor invo-
lucra in altero; in utriusque invo-
lucris vero usum folium superius

serratum, reliqua integra. Primus
e basi ad involucrem usque rubens,
alter inferius tantum rubescens, co-
tera ut in descript. Cl. Gussone.
Descriptioni autem E. Neapolitanae
Cl. Ten. addendum quod umbella
in nostra est 3—5 lida, sub umbella
minime extant rami floriferi dichoto-
mici, et caules ad basim sunt fru-
ticulosi. Alia specimen, quae decer-
pimus alias plus minusve variolates
ostendunt; optimum quidem Cl.
Gussone, cui observationes nostras
communicavimus, iudicium profere-
bat litoris, quas habet similis. s. Spe-
cies proteiformis quoad habitum,
s. folia, ramos sub umbella fertiles
s. etc. ita ut illius exacta descriptio
s. vel nimis longa, vel difficilis nimis.
In arenosis et calcareis ubique.

A februario ad septembrem.

— **Deadroides L.**

In sylvestribus, et nemoribus. s. Pietra,
s. Mauro, Gracie, Bochiello, s. Ba-
rdella et alibi.

A decembri ad aprillem.

— **helioscopia L.**

In arenoso-calcareis cultis, et incultis,
in moderatis, ad sepes obvia.

A decembri ad majum.

— **akenocarpa Guss.**

In argillasis, demissis subdomidis.
Fontana-della-Pietra, Refugio, Soc-
corso.

Aprili et maio.

— **ceratocarpa Ten.**

In humilibus arenoso-calcareis, et
argillasis. s. Mauro, Bardella, Mon-
te-rosa, et alibi.

A maio ad augustum.

— **amygdaloides L.**

In sylvestribus, dumetis, et ad sepes
abundans.

A februario ad aprillem.

Euphorbia Characias L.

Cum praecedente.

A Januario ad martium.

Euphorbia biglandulosa Desf.

In collibus sterilibus. *Sicily*.

Martio.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA

Opuntia ficus-indica Mill.

var. a fructu lutescente

b fructu albedo

c fructu sanguineo

d fructu aspermo.

Ubique, praesertim in collibus sterilibus, et lapidosis amoenis varietates, ac ad sepes cum *Agave-americana*.

A maio ad julium.

— *amyclaea* Ten.

Cum praecedente, et eodem tempore floret.

Myrtus communis L.

In sylvaticis, ac in nemoribus, s.

Pietro, Mazzarone.

Aprili et maio.

Punica granatum L.

Ibidem, sed rarior.

Maio.

Amygdalus communis L.

In calcareo-arenosis meridionalibus frequens. *Boschiello, s. Mauro.*

Januario et februario.

Prunus cerasus a caproniana L.

Olim culta aunc aposte provenit.

Martio, et aprili.

— *spinosa* L.

In sylvaticis, dumetis, nemoribus, ac ad sepes passim.

Februario martio.

Mespilus monogyna Willd.

Ibidem cum praecedente.

Martio, et aprili.

Pyrus communis L.

Ibidem, plaga praesertim meridionali.

A martio ad majum.

— *cuneifolia* Guss.

Cum praecedente, sed abundantius, et eodem tempore floret.

POLYGYNIA

Rosa semper-virens L. — var. a

Adda descriptioni Cl. Gussone, quod petala sunt bifida.

Ad sepes, et inter vepres, s. Marco,

Madonna-della-riva, et alibi.

Ab aprili ad junium.

— *canina* L.

In seculis et dumetis abunde.

Eodem tempore.

— *dumetorum Thuil* ex Guss. — *sepium Thuil* ex Ten.

Adda descriptionem utriusque Cl.

Guss. et Ten. quod acetosi sunt compressi, ac ad basin dilatati, re-bentes, et adunci, petala divaricato-emergentia.

Ad sepes. *Via-tru-Boschiellulo, e-Bolotazze, Semini.*

Eodem tempore.

Rubus dalmaticus Tratt. Ros. ex D. C.

Ad sepes, in sylvaticis, dumetis, et nemoribus, ad muros dirutos valde infestus.

Eodem tempore.
Potentilla reptans L.
 In humidis et umbratis, ad sepes ber-

bosas Mazzi-ecchi, s. Lorenza, Mo-
 schina, Mazzone, et alibi abunde.
 A februario ad septembrem.

POLIANDRIA

MONOGYNIA

Capparis rupestris Smith.

In rupibus calcareis. Montagna, Rocca,
 Manina, Seltaggio, Bellafazzo etc.
 Majo et junio.

— *spinosa L.*
 Ibidem et Balchini, Scala etc, et eodem
 tempore floret.

Paspaver hybridum L.

Inter segetes ubique.

Aprilis et majo.

— *Rhocas L.*

Ubique in cultis, et in cultis herbosis,
 ac etiam in ruderalis.

A martio ad majum.

— *somniferum L.*

Quondam cultum, nunc spontaneam
 alicubi prevalet.

Aprilis et majo.

Cistus creticus L.

In nemoribus et in sylvaticis communis.

Aprilis et majo.

— *salvifolius L.*

Ibidem, et eodem tempore.

— *Monseliense L.*

Cam praecedentibus, et eodem tempore.

Elionthemum viride Ten.

In incolis calcareis, et in collibus ste-
 rilibus. Coste di - s. Giuseppe, e del-
 F-acqua-dolce, Cansarica.

Ab Aprilis et junium.

— *arabicum Pers.*

Ibidem.

Aprilis et majo.

PENTAGYNIA

Paeonia Russi Biv.

In submontanis. Cansarica.

A martio ad majum.

Delphinium longipes Moris.

Undique per arva, et campos.

Aprilis et majo.

Nigella damascena L.

In argillosis, et calcareis herbosis, in-
 ter segetes, ac etiam in sylvaticis
 satis frequens.

Ab aprilis ad majum.

POLYGYNIA

Anemone coronaria L.

In arenosis, calcareis, et argillosis
 abunde.

A februario ad martium.

— *hortensis L.*

In domibus calcareis, et collibus.

s. Basilio, s. Lorenza, Mazzone,
 Stretto-della-palle, Paradiso etc.

A januario ad aprilis.

Clematis vitalba L.

In dumetis subhumidis, et umbratis

sylvaticis. *Bardella*, *Mazzone*, s. *Pietro*, *Granieri*. A janio ad augustum.

Clematis cirrhosa L.

In sylvaticis ac fruticosis et in fissuris rupium, ad sepes. *Mazzone*, *Sarcoca*.

A septembri ad decembrem ac usque ad januarium.

Thalictrum calabricum Spr.

In sylvaticis herbosis non rarum.
Ab aprili ad januiam.

Adonis Cupaniana Guas.

In argilloso-arenosis inter segetes, et ad marginem viarum. *Soccero*, *Pelle*, *Giunco*, *Belmangiaro*, *Mulana*.

Aprili et incerto majo.

Ranunculus Ficaria L.

In herbosis et cultis, ac etiam ad vias.
s. *ta Maria-di-Gesù*, *Fiscara*, s. *Bartolomeo*, *Bardadaro*.

A decembri ad martium.

— **bellatus a L.**

In apricis herbosis, et ad vias abunde, incerto autumno.

— **millefoliatus Vahl.**

In collibus arenoso-calcareis. *Sfere*, *Escuriales*.

Aprili et majo.

Ranunculus flabellatus Desf.

In subhumidis argilloso-arenosis. *Valle-di-Bardella*.

Eodem tempore floret.

— **velutinus Ten.**

Ibidem et *Rungosta*, *Cappuccini-vecchi*.
Ab aprili ad juniam.

— **repens L.**

Ibidem, et eodem tempore floret.

— **Philonotis Reiz.**

In humidis, ad sepes herbosas. *Bardella*, *Orti-dell'-acqua-nuova*, *Regatema*, *Cappuccini-vecchi*.

A decembri ad majum.

— **trilobus Desf.**

In cultis humentibus. *Pelle*.
Majo.

— **muricatus L.**

In cultis, et inter segetes. *Colle-a-Biaggio*, *Sfere*, *Mulana*.

Aprili et majo.

— **arvensis L.**

Ubique inter segetes.

Aprili et majo.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA

Ajuga Iva Scrob.

In calcareis sylvaticis, et lapidosis.
Setraggio, *Cansaria*.

A martio ad junium.

— **orientalis b L.**

Ibidem, et ad sepes umbrosas. *Cansaria*.

A martio ? ad majum.

— **Chia Scrob.**

Adversendum quod lobus inferioris corollae lobus medius est bifidus, et

caules striato-angulati, et semi rubescentes.

In rupibus calcareis. *Setraggio*, *Belladonna*.

Aprili ad juniam.

Tenerium flavum L.

In submontosis humidisculis. *Cansaria*.

Ab aprili ad juniam.

— **fruticans L.**

In sylvaticis, ad sepes, ad fissuras rupium, ubique.

- A martio ad septembrem.
Teucrium Chamaedrys L.
 In collibus calcareis, et murosis.
Montagna, Salsatorella, Rocca, Amata etc.
 A majo ad julium.
- **scordiodes Schreb.**
 Ibidem.
 A majo ad octobrem.
- **Polium L.**
 In arenoso-calcareis. s. Mauro.
 Ab aprili ad junium.
- Sideritis Romana L.**
 Ad margines agrorum, ad vias. *Madonna-della-via, Bardella.*
 Ab aprili ad majum.
- Mentha sylvestris L.**
 In humentibus et ad rivulos frequens.
 Junio et julio.
- **macrostachya Ten.**
 Ibidem—occurrit plures varietates.
 Eodem tempore II.
- **aqualica L.**
 In aquosis, et adis abundat.
 Ab augusto ad novembrem.
- **Pulegium L.**
 Nil abundatius ubique.
 A majo ad julium.
 var. *b. hirsuta Guss.*
 In montosis, et submontosis. *Camasaria.*
 A majo. ad . . .
- Lamium pubescens Sibth.**
 In demissis sylvaticis. s. *Pietro a. Basilio.*
 Ab aprili ad junium.
- **plexicaule L.**
 In cultis herbosis, in viis, ad vias,
 et margines agrorum frequens occurrit.
 A februario ad majum.
- Stachys Dasyanthos Raf.**
 In nemoribus, et sylvaticis aridis.
Granieri, s. Pietro, Mazzarone, Camasaria.

- Junio.
Stachys arenaria Vahl.
 In aridis sterilibus, ad vias. *Semin, Fontanille.*
 Aprili et majo.
- **hirta L.**
 Inter segetes non rara. *Picena di-cer-bone, et alibi.*
 A martio ad majum.
- **arvensis L.**
 In arvis arenosis herbosis. s. *Merio-di-Geri.*
 Ab idibus februarii ad ocnos aprilis.
- Marrubium vulgare L.**
 In pinguibus, latis, ruderalis, ad vias
 ubique.
 A martio ad angustum,
- Ballota foetida Lam.**
 Ad vias ubique.
 Ab aprili ad octobrem.
- Phlomis fruticosa L.—var. a Guss.**
 In calcareis lapideis incolis et syl-vaticis. *Ruosa, Rocca, Salsatorella.*
 A majo ad julium.
- **herbaventi L.**
 In argillosis collibus et demissis, ac
 etiam in rupibus calcareis. *Molino-vento, Scala, Montagna. Amata, Re-fugio, Pile, Salsatorella.*
 Majo et junio.
- Origanum virens Hoffm.**
 Omnis ut in descriptione Cl. *Gussonei*
 bracteae vero apice nudae, et calyci-bus longiores, sed non duplo.
 In submontosis herbosis umbrosis sub-humidis. *Paradiso, Tabascio, East-stella.*
 A junio ad angustum.
- Satureja canescens Guss.**
 In collibus sylvaticis. *Mazzarone, s. Pietro, s. Basilio.*
 Majo.

Satureja graeca L.

In demissis arenosis incolitis, ad vias
passim.

Ab aprili ad septembrem.

var. *b.* caule adultiore,
ramoso, calycinis laci-
niis, foliis, et caulo mi-
nus villosis.

In calcareo-arenosis. Tabascio.

Eodem tempore floret.

Clinopodium vulgare L.

In sylvaticis et ad sepes non rarum.

A majo ad augustum.

Thymus capitatus Hoffm. et Link.

In collibus sylvaticis, et sterilibus le-

pidosis satis frequens.

A junio ad augustum.

Thymus nepeta Smith.

In pratis, sepius, pomariis, et pa-
scuis ubicunque.

A majo ad octobrem.

Prunella laciniosa L.

In sylvaticis, ac dumetis, et ad sepes.

Canaria, Seleaggie.

Majo.

Prasium majus L.

In collibus calcareis sylvaticis, ad fla-
turas rupium, et sepes. *s. Bastia,*

Mezzene, Noca.

A februario ad majum.

ANGIOSPERMIA**Verbena officinalis L.**

In arenoso-argillosis, et calcareis aban-
dis. *Bardellu, Cistelli, Semini, Bol-
metegère.*

Floret sero per totum annum.

Euphrasia rigidifolia Bie.

In submontosis aridis. *Canaria.*

Invaso autumn.

— serotina L.

In vertice montis *Canaria.*

Augusto.

Bartsia trixago L.

var. *a.* flore luteo.

Caule subterrelli, et viride-alba.

var. *b.* versicolor.

Caule rubescente, et obtuse tetragono.

In rupibus calcareis, et ad margines
agrorum, procerum var. *b. Belladonna, Montagna.*

Majo junio.

var. *spica viscosa.*

In arenoso-calcareis ad vias. *Coppue-
cini-seccà.*

Eodem tempore.

var. labio superiore pur-
pureo, inferiore luteo.

In argilloso-calcareis, *Giunco.*

Eodem tempore.

Bartsia viscosa L.

In submontosis humentibus. *Canaria.*

Aprili et majo.

— latifolia Smith.

In campis aridis apricis. *s. Mauro.*

Invaso vere.

Linaria cymbalaria Pers.

In ruderalis, in muris vetustis fre-
quens.

A martio ad majum.

— graeca Cavan.

Ubique in arvis et campis.

A junio ad septembrem.

— spuria Pers.

In aridis submontosis, et campis, ac

inter argeles.

Eodem tempore.

Linaria triphylla Desf.

In densiss. Ori-della-Grazia.

Aprilis et maio.

- *reflexa* Desf. — var. *b.* corolla alba, palato flavescente Guss.

In arenoso-argillosis, et calcareis, herbida, ad vias obvia.

A januario ad majum.

- *stricta* Sibth. et Smith.

In aridis arenoso-calcareis, in campis, ad viarum margines herbosus, ac etiam in sylvaticis satis frequens.

A martio ad octobrem.

- *Chalcensis* Pers.

In submontosis argillosis. s. Giovanni-Birichini.

Aprilis et maio.

Antirrhinum siculum Ucria.

In ruderalis, ad muros, ac etiam in turribus abvia.

Floret fere per totum annum.

- *oronium* L.

In cultis, ruderalis, et ad muros dirutis frequens.

Ab aprilis ad julium.

Scrophularia peregrina L.

In pinguibus, sinetis, ruderalis, vulgaris.

A februario ad majum.

- *grandidentata* Ten.

In declivitate montis Canaria, in humidis, prope s. Michele.

A maio ad . . .

- *canina* Willd.

Cum precedente.

A maio ad . . .

Acanthus mollis L.

In humcilibus, ad rivulos, ad mueries, in ruderalis et sub umbra ubique.

A martio ad junium.

Orobanche pruinosa La Peyr.

Ad radices *Viciae Faba* alicubi ad calamitatem usque.

Aprilis et maio.

- *ramosa* L.

Ad radices leguminosarum.

Eodem tempore floret.

TETRADYNAMIA

SYNCLISTA

Raphanus Raphanistrum L.

In cultis et arvis arenoso-calcareis, ac inter segetes frequens.

A martio ad majum.

Rapistrum rugosum D. C.

In aridis argillosis, inter segetes, et ad vias ubique.

Eodem tempore.

Bunias Erucago L.

In pascois, et campis apricis, ac in arvis non raro.

A februario ad aprilitem.

Neslia paniculata Dera.

In cultis, arvis, et inter segetes.

A martio ad majum.

Senebiera coronopus D. C.

In ruderalis, ad compages lapideam in vis stratis campestribus, Acquasura, s. Marco, Malino-a-cento,

Aprilis.

Clypeola Jonthaspi L.

In ruderalis, et aridis apricis elatis.

Canaria,

Aprilis?—Nonnisi fructum vidimus in usulo maio.

Biscutella lyrata L.

var. *b.* fructibus margine ciliatis, disco glabris Guss.

— var. c. fructibus

glabris *Guss.*

In pratis, campis, collibus, ad vias ubique annua varietates.

A januario ad majam.

Isatis canescens D. C.

In collibus apricis subargillosis. Seals Montagna,

Majo et junio.

SILICULOSA

Iberis semper-florens L.

In calcareis lapideis, et ad fissuras rupium.

A decembri ad martiam.

Lepidium Draba L.

In argillosis collis, frequens.

Aprilis et majo.

— *graminifolium L.*

In rudentis, ad vias, et vias vulgare.

Ab aprilis ad octobrem.

Capsella Bursa-pasteris D. C.

var. *b. integrifolia D. C.*

In campis, arvis, collibus, rudentis,

ad vias et muros passim.

A novembri ad majam.

Draba verna L.

In aridis incolitis, ad margines viarum mucosus copiosus.

A januario ad aprillem.

— *praecox Ster.*

Cum praecedente, eodemque tempore flori.

Alissum maritimum L.

In pratis rudentis, viscidis, pascuis, secus vias, ubicunque.

Flori et per totum annum.

SILIQUOSA

Nasturtium officinale D. C.

In aquis, ad fontes et rivulos. Valli di-Bardella, Rangoile, Saracena, Novara, Matrone etc.

A decembri ad majam.

Cardamine hirsuta L.

Ad viarum margines ambrosas, ad sepes herbasas, in rudentis, in campis et arvis subhumidis, abunde.

A januario ad aprillem.

Arabis turrata L.

In arenosis humidioribus, et ad sepes. Moschias, s. Mauro, Portosanto.

— *collina L.*

In arenosis herbosis. Escarjoles, Fiescra.

A februario ad aprillem.

Cheiranthus Cheiri b. fruticulosus

D. C.

In turribus vetustis, et ad muros in praecario.

Martio et aprilis.

Barbarea taurica D. C.

In aquis submontosis. Censaria.

Majo.

Malcomia parviflora D. C.

Adde descriptioni Cl. Gussone calycis violaceus et corollas rosas.

In collibus arenosis sterilibus. s. La Catterina.

A februario ad aprillem.

Sisymbrium polyceratum L.

In rudentis, secus vias, ubique.

Aprilis et maja.

Sisymbrium officinale D. C.

Idem.

Ab aprili ad junium.

— **thalianum Gay et Menn.**

In pascuis, et collibus arenosis ad vias.

A januario ad junium.

Diploaxis crassifolia D. C.

In rupibus gypsaceo-marneis. *Rocca, s. Ippolito.*

Aprili et maio.

— **tenuifolia D. C.**

In collibus arenoso-argillosis. *Bardella.*
A martio ad septembrem.

— **erucoides D. C.**

In campis, arvis, et pratis copiosè.
Floret fere per totum annum, praesertim a martio ad novembrem.

— **viminea D. C.**

var. *b. integrifolia Guss.*

In cultis, et incultis frequens.

A januario ad novembrem.

Moricandia arvensis D. C.

In collibus argilloso-calcareis, et gypsaceis. *Montagna.*

A martio ad junium.

Brassica campestris L.

In cultis, et incultis abundè.

A decembris ad majum.

Eruca sativa D. C.

In arvis, et campis apricis meridionalibus raro rara.

A februarii ad aprillem.

Sinapis amplexicaulis D. C.

In cultis, et herbis argilloso-calcareis.

A martio ad majum.

— **nigra L.**

In agris, et arvis arenae-argillosis, et calcareis frequens.

Aprili et maio.

— **arvensis L.**

In agris, et arvis argillosis, ac inter segetes.

A martio ad majum.

— **incana L.**

In campis, collibus, et pascuis frequentes.

Aprili et maio.

— **alba L.**

In ruderalis, saxosis, et ad muros obvia.

Incensio vere.

— **dissecta L.**

In cultis, inter *Linum catharticum*, et *Cl. Guss.* vidit.

Eodem tempore floret.

MONADELPHIA

PENTANDRIA

Erodium romanum Willd.

var. *b. canescens Guss.*

In campis herbosis, ad margines viarum frequens.

Ab octobri ad junium.

— **cicutarium Willd.**

var. *b. pimpinelli-folium*

Guss. c. praecox Guss.

In aridis et subhumidis incultis, in ruderalis in campis, et ad vias ubique proveniunt omnes varietates.

A februarii ad aprillem.

Erodium moscatum Willd.

Cam praecedentibus obvium.

A januario ad majum.

Erodium Botrys Bertol.

In submontosis calcareo-arenosis. Con-
suetis.
Majo floret.

Erodium malacoides Willd.

In campis herbosis, et humidis-
culis, ad sepes, et margines via-
rum umbrosas, abunde.
A februario ad majum.

DECANDRIA

Geranium sanguineum L.

In demissis humentibus, in conval-
libus, ad curius aquarum lenta
fluentem, et in submontosis, subhu-
midis. s. Bartolomeo, Mazzone, Ta-
bascio, s. Lorenzo, Valle-di-Pitome.
Ab aprili ad junium,

— **tuberosum L.**

In collibus argilloso-calcareis. Men-
tagna Cusaria.
A februario ad aprillem.

— **pyrenaicum L.**

In campis herbosis arenoso-calcareis.
s. In Maria-di-Gru, Portofino.
Ab aprili ad junium.

var. *b. leucocarpum?* Guss.

Ibidem, et eodem tempore floret,
sed capsulas non vidimus.

— **lucidum L.**

In ruderalis herbosis, ad ripas, et sepes
gramineas, vel muscosas frequens.
A martio ad junium.

Geranium rotundifolium L.

In campis aridis, in ruderalis, ac
etiam in herbosis.

Ineunte vere.

— **molle L.**

In humentibus et umbrosis, ad mar-
gines herbosas viarum. Valli-di-Bar-
della, Saracena, Rangesile etc.
A martio ad majum.

— **dissectum L.**

var. *β* floribus albis N.
varietates *α*, *β* collegi-
mus eodem tempore et
solo.

In cultis humentibus, et umbrosis.
Valle-di-Bardella.

Aprili.

— **robertianum L.**

Ad sepes umbrosas, et sylvestras.
Rangesile.
Ineunte vere.

POLYANDRIA

Althaea hirsuta L.

In campis et collibus aridis, et argil-
lois. Balchius, Scala.
Majo et junio.

Malva cretica Cav.

In arvis, campis, et viis ubique.
Aprili et majo.

Malva parviflora L.

In ruderalis, ad vias, et maceris
frequens.

A martio ad majum.

— **Nicacensis Willd.**

In campis, arvis, ruderalis, ad vias
ubique.

A martio ad junium.

Malva ambigua Guss.

In rudertis, et in campis herboſis.

Aprilis et maio.

— **sylvestris L.**

Ubique nihil vulgaris.

A martio ad junium.

var. *b. Ten.*

In arvis humidiſculis. *Orti-ſecundo-4. Cappuccini.*

Eodem tempore floret.

— **polymorpha Guss.**

In arvis, incolitis, rudertis, et ad vias.

Ab aprilis ad junium.

Lavatera hispida Desf.

In dometiſ, fruticetiſ, ſylvaticiſ, ad ſepes; communis.

Aprilis et maio.

— **sylvestris Brot.**

In herboſis apriciſ. *Martello, Portorata.*

A martio ad majum.

— **trimestris L.**

Recedit a deſcript. Cl. Guss. pedunculiſ petiolo breviorib.

In cultiſ demissiſ, et ſubhumidiſ.

Falle-di-Ravenna.

A martio ad auguſtum.

DIADELPHIA

HEXANDRIA

Fumaria capreolata L.

In rudertis, in cultiſ et ad ſepes herboſas hooſd rare.

A dicembri ad aprilem.

— **ſtrobilata Gaſpar.**

Ad agrorum margineſ, et in cultiſ herbiſis abunde.

A januario ad aprilem.

— **agraria Lag.**

In cultiſ humidiſ, et herboſiſ frequenſ.

Eodem tempore.

Fumaria officinalis L.

In cultiſ et in cultiſ, maceriet et rudera copioſe.

A dicembri ad aprilem.

— **leucantha Vir.**

In cultiſ et vineiſ, ſe ad margineſ viarum.

Inſeunte vere.

OCTANDRIA

Polygala monſpeliaca L.

In campis aridiſ ſteriliſ. s. Burio-

lomeo, s. In Maris-di-Geſu.

Aprilis et maio.

DECANDRIA

Spartium junceum L.

In ſylvaticiſ, ad ſepes ſubmoſtoſas in aridiſ abunde.

Ab aprilis ad junium.

Calycotome spinosa Link.

In dometiſ, et fruticetiſ ſylvaticiſ. s. *Pietro, Graniero.*

Inſeunte vere.

Calycotome infesta Guss.

Ad sepes in collibus calcareis aridis.

Piano-di-Carbone, Soracena, s. Ba-
silio, et alibi.

Ab aprili ad majum.

— *villosa* Link.

In sylvaticis aridis, et ad sepes. Bochi-
ello, s. Pietro.

A martio ad majum.

Cytisus triflorus L' Hérít.

Ibidem, et paula praecoxior floret.

— *candicans* D. C.

Ibidem, et in collibus calcareis. Sal-
ernello.

A martio ad majum.

Oenonis Columnae All.

In submontosis calcareis. *Canaria*,
Bulchini, s. *Bartolomeo*.

A majo ad septembrem.

— *oligophylla* Ten.

In collibus et campis argillosis her-
bosis ac etiam in marosis. *Mulino-
a-rente*, *Muluna*, *Cascatone*, *Rocca*,
Montagna.

Ab idibus maji ad julium.

— *minutissima* L.

In arvis, et campis argillosis. Ibi-
dem.

Majo.

— *ornithopodioides* L.

In collibus calcareis-aridis. *Canaria*.
Aprili et majo.

— *secula* Guss.

Ibidem et eodem tempore floret.

— *Sieberi* D. C.

Ibidem, et eodem tempore floret.

— *ramosissima* Desf.

In collibus, et submontosis calcareo-
arenosis et argillosis. s. s. *Brigida*,
Sferre, *Portella*, s. *Biagio*, et alibi,
praesertim in incolis, et sylvati-
cis, abunde.

Ab aprili ad augustam, et ultra.

Vulneraria heterophylla Moench.

var. c. *flaviflora* Guss.

In collibus calcareo-arenosis aprica.
s. s. *Brigida*, *Escarvales*, *Tubacio*,
Mazzone.

Ab aprili ad junium.

— *tetraphylla* Guss.

Convenit cum descriptionibus Cll.
Guss. et Ten; differt tantum quod
capitula in nostris sunt 6—10, flo-
ra, minima 3—4 at ex Ten. vel
placidiore ut ex Guss.

In collibus calcareo-arenosis incolis,
ad rorgines agrorum. s. *Bartolo-
meo*, *Paradiso*.

A martio ad majum.

Lupinus angustifolius L.

In fastigio montis *Canaria* abunde.
Majo boreali.

Lathyrus Aphaca L.

In arvis, agris, et inter segetes pas-
sim.

Aprili et majo.

— *cicera* L.

In campis, et collibus apricis fre-
quens.

A martio ad majum.

— *annuus* L.

Ibidem ac etiam inter segetes.

Aprili et majo.

— *sylvestris* L.

In arenoso-calcareis et argillosis, tam
sylvaticis, quam incolis, ac ad
sepes herbosas. s. s. *Caterina*, s.
Bartolomeo, *Nocera*.

Majo et junio.

— *pratensis*.

In demissis caespitosis lumentibus. *Val-
le-di-Bardilla*.

Eodem tempore floret.

Lathyrus tenuiflorus Desf.

In arenoso-calcareis herbosis, ac etiam in dumetis. Mazzone, Madonna-della-cia, s. Bartolomeo.

Aprilis et maio.

— **ochrus D. C.**

Inter segetes ubique, locuste vere.

Pisum arvense L.

In dumetis herbosis, in agresticis, ad sepes obvium.

Aprilis et maio.

Vicia hybrida L.

Ibidem.

A martio ad majum.

— **saliva L.**

Inter segetes copiose. Martio et aprilis.

— **angustifolia Roth.**

Cum praecedente, et fere eodem tempore floret.

— **peregrina L.**

In collibus calcareis aridis, et inter frumeta.

Aprilis et maio.

— **Rhynchos L.**

In apricis subhumidis, et inter segetes. Bardonia.

Eodem tempore floret.

— **dasycarpa Ten.**

In collibus herbidis arenoso-calcareis, et argillosis haud rara.

A martio ad majum.

Glycyrhiza glabra L.

In arenoso-argillosis et calcareis copiose. s. Mauro, s. Lorenzo, s. Bartolomeo, Rigolizia.

A junio ad augustum.

Coronilla scorpioides Koch.

In collibus, arvis, et pascuis herbis apricis abunde.

Ab aprilis ad julium.

Ornithopus compressus L.

In collis, et incultis aridis. Saracena, Piano-di-Carbone.

A martio ad majum.

Hippocrepis unisiliquosa L.

In argilloso-calcareis. Ori-dei-miracolì, Belmangiarè, s. ta Caterina, Vigorosa.

A martio ad majum.

Scorpiurus subvillosa L.

Inter segetes, et vineas, ac ad margines agrorum. Abate, Tabiano, s. Bartolomeo et alibi.

Aprilis et maio.

Hedysarum coronarium L.

In pinguibus, et cultis copiose. Valle-di-Pione, Scalo, Manina, Mercimino et alibi.

Aprilis et maio.

— **capitatum Desf.**

In argilloso-arenariis. Abate. Maio.

Onobrychis caput-galli D. C.

In collibus arenoso-calcareis. s. la Brigida, s. Mauro, Tabascio.

Aprilis et maio.

Astragalus pentaglottis L.

In collibus calcareo-argillosis. Monagana.

Maio.

— **sesameus L.**

In collibus sterilibus. Concaris, s. Pietro.

Maio.

— **boeticus L.**

In collibus herbosis humidiusculis. Portella-s. Biagio.

Incolte vere.

— **hamosus L.**

In demissis humantibus. Valle-di-Bardella.

Eodem tempore.

Psoralea bituminosa L.

In calcareis et argillosis. s. Mauro,
Ponte-della-Rocca, Pute, et alibi.
A martio ad augustum.

Melilotus italica D. C.

In cultis et in collibus apricis.
Martio et aprilis.

— *parviflora Desf.*

In herbidis humentibus. S. fere, Valle-
di-Bardella.

Majo.

— *sulcata Desf.*

In collibus apricis, inter segetes hodie
rara.

A martio ad majum.

— *infesta Guss.*

Ubique inter frumenta sat infesta.
Eodem tempore.

— *elegans Salzm.*

Inter segetes, et in herbosis apricis.
Boschiello, s. Mauro.

Majo.

Trifolium congestum Guss.

In campis, et arvis ac ad vias passim.
Aprilis et maio.

— *glomeratum L.*

In arvis, collibus herbosis, et pratis
hodie rarum.

Eodem tempore.

— *scabrum L.*

In campis, et collibus aridis apricis
frequens.

A martio ad majum.

— *pratense L.*

In collibus sylvaticis. Casertina.
A majo ad . . .

— *Cherleri L.*

In campis herbosis apricis, et pascuis
aridis.

A martio ad majum.

— *squarrosum L.*

In cultis herbosis, et pascuis sub-

humidis. Argutene, Boschiello, Bo-
schello.

Aprilis et majo.

Trifolium lappaceum L.

In arvis, ac inter segetes frequens.

Eodem tempore.

— *stellatum L.*

In collibus apricis, ad margines via-
rum obvium.

Eodem tempore.

— *incarnatum Ucria.*

In campis apricis herbosis. s. in Case-
rina, Bardella, et alibi non rarum.

Eodem tempore.

— *angustifolium L.*

Inter frumenta, ad vias herbosas
et piosas.

— *arvense L.*

In collibus, et campis arenoso-calca-
reis ubique.

Eodem tempore.

— *subterraneum L.*

In collibus et arvis, ac ad vias. s. in
Maria-di-Gesù, s. Buntolunco, Cap-
puccini-vecchi, et alibi.

A martio ad majum.

— *repens L.*

In campis, arvis, pratis, ad vias,
ubique.

Ab aprilis ad junium.

— *spumosum L.*

In campis apricis, et collibus frequens.

Aprilis et majo.

— *vesiculosum Sav.*

In campis aridis, et collibus sterili-
bus abunde.

Eodem tempore.

— *fragiferum L.*

Ibidem et in pascuis apricis.

— *respinatum L.*

In campis arenoso-calcareis herbosis.
s. in Maria-di-Gesù.

Eodem tempore.

Trifolium tomentosum L.

In campis et collibus aridis incolitis.
a. Biagio.

Eodem tempore.

— **campestre Schreb.**

In arvis, et agris subhumidis post
massam. Bardella.

Ab aprilis ad junium.

Lotus tetragonolobus L.

Ibidem, et Steris, Purgatio, a. Biagio,
Belmangiare, et alibi.

A martio ad majum.

— **edulis L.**

In arenosis aridis copiosus. a. Maria-
di-Grati, a. Mauro etc.

A februario ad aprilitem.

— **rectus L.**

In demissis humidis cespitosis. Valle-
di-Bardella, Rongasile.

Ab aprilis ad junium.

— **ornithopodioides L.**

Ibidem, et in agris, in campis, et
collibus obviis.

A martio ad majum.

— **cytisoides L.**

In collibus sterilibus et saxosis frequens.

A martio ad majum.

— **prostratus Desf.**

In demissis subhumidis, et in campis
herbosis haud rarum.

Ab aprilis ad junium.

Trigonella corniculata L.

In campis herbosis, et collibus apri-
cis frequens.

Aprilis et maio.

Medicago Helix Willd.

In arenosis, argillosis, et calcareis, ubique.

Eodem tempore.

Medicago orbicularis Allion.

Rotunda e descriptionibus Cili. Guas. et
Ten. quod in nostra pedunculis sunt
4—5 flori minime subdiffiori.

In arvis, et agris abunde, ac inter
segetes.

Aprilis et maio.

— **elegans Jacq.**

In calcareo-arenosis haud rara.

Eodem tempore.

— **recta Desf.**

In collibus aridis, ad vias, et rudera
ubique.

A martio ad majum.

— **muricolepis Tin.**

In arvis, inter segetes, ad vias.

Aprilis et maio.

— **Echinus D. C.**

In campis, arvis, et inter segetes ubique.

Eodem tempore.

— **tuberculata Willd.**

In collibus arenoso-calcareis, inter se-
getes. Escursiales, a. a. Brigida.

Eodem tempore.

— **murex Willd.**

In argilloso-arenosis et calcareis inter
segetes satis frequens.

Eodem tempore.

— **murex Willd.**

In argilloso-arenosis et calcareis inter
segetes satis frequens.

Eodem tempore.

— **muricata Willd.**

Cum praecedente, et liadem mensibus
floret.

POLYADELPHIA

Hypericum hircinum L.

In umbrosis humidis, ad sepes. Fiscare,

Portosanto, etc.

A maio ad junium.

Hypericum perforatum a. ciliatum D. C.

var. *b. microphyllum* D. C.

In collibus aridis, in campis sterilibus,
ad vias, abunde.

A majo ad julium.

Hypericum ciliatum Lam.

In argilloso-calcareis. *Belmonte*.
Majo et junio.

SYNGENESIA

AEQUALIS

Goropogon glabrum L.

In campis graminosis, ac inter segetes
frequens.

Aprili et majo.

Tragopogon Cupani Guss.

In campis fertilibus argillano-calcareis,
et in collibus apertis haud rarum.

Scelopio, *Ruosa*, *Montagna*.

Aprili et majo.

— *porrifolium* L.

Cum precedente, eodemque tempore
flore.

Urospermum Dalcampii Desf.

In submontosis, et ad sepes abunde.

Aprili et augustum.

— *picrioides*

In aridis incultis, ad sepes, et ad mar-
gines viarum frequens.

A februario ad majum.

Scorzonera laciniata L.

In collibus calcareis. *Montagna*, *Bud-
chén*, *Casuaris*.

Aprili et majo.

— *Columnae* Guss.

In collibus calcareis aridis, ac etiam
in herbosis apertis, s. *Pietro*.

Eodem tempore.

— *hirsuta* L.

Cum precedente, et eodem tempore
flore.

— *deliciosa* Guss.

var. flore alba-rarior.

In collibus calcareis herbosis apertis.

Scata, *Salvatorello*, *Gumco*, *Monta-
gna*.

Majo flore.

Sonchus maritimus L.

In demissis humculibus. *Tabascio*, *Regal-
sena*, *Paradiso*.

A majo ad octobrem.

— *oleraceus* L.

In cultis humculibus demissis vulga-
tissimus.

Ab aprili ad junium.

— *asper* Willd. et Guss.

Recolit a descriptione Cl. Guss. foliis,
spinoso-serratis, et caulo superat
pedunculis, et anthodis hirsutis. Dif-
ferre videtur a descript. Cl. Sco-
poli. (*Hieracium arvense* L.) foliis
tantum anthodii viridatis, sat bene in
coeteris carneis. Adle caules angulo-
sos, nitide rubentes, 2 1/2 ped.

Folia radicalia non vidimus.

In edit. *Valle-di-Bardella*, e *di-Ran-
gasù*.

Ab aprili ad junium, aliquo flore ad
novembrem usque.

— *tenerimus* L. — var. c. foliis

bipinnatifidis, laciniis an-
gusto linearibus, denticu-
latis Guss.

In argilloso-arenosis. *Orti-dri-miracoli*.

Altera varietas differt a var. c. do-
scripta a Cl. Guss. quod petioli ad
basin sunt acute auriculati, et pe-

dantuli minime, oculi, sed par-
vissima hucari bracteola suffulta.
Ibidem.

Ambae var. florent fere per totum
annuum.

Sonchus pteroioides Lam.

In herbosis, rodentis, ad muros, et
vias passim.

Fl. fere per totum annum.

Lactuca virosa L.

In pinguibus humidiusculis. *Orti-dell-
acqua-muoca, e del-miracoli.*

A julio ad augustum.

Leonodon Taraxacum L.

In collibus apicis. a. Mauro.

A februario ad . . .

Apargia Sicula Guss.

In campis argilloso-calcareis, ad mar-
gines viarum. *Setteggio, Mula, a.
Bocca.*

Aprili et maio.

Picris spinulosa Bertol.

Passim ad vias, in herbosis humidis,
et ad fossas.

A junio ad octobrem.

Helminthia echinoides Willd.

Cum praecedente.

Ab aprili ad septembrem et ultra.

Illicium bulbosum Willd.

In cultis, et incultis humidiusculis gra-
minosis haud raro.

A martio ad majum.

Andriana undulata Presl.

In arenoso-calcareis, ad vias hinc
inde.

Ab hibus aprili ad augustum.

Crepis purpurea Guss.

In herbosis demissis, et in collibus
apicis frequens.

Ab idibus aprili ad junium,

— hirsifolia L.

In calcareis aridis, ad vias. *Setteggio,*

Salcatorello et aliibi haud raro.

Ab aprili ad septembrem.

Crepis taraxacoides Desf.

In pascuis, in arvis herbo-is, inter
gramina ad vias, et sepes.

A novembri ad majum.

— spathulata Guss.

In campis saluberrimis, argilloso-calca-
reis. *Montagna, Russa, Refugio.*

Eodem tempore.

Tolpis quadrifariolata Bir.

In arenosis, calcareis, et argillosis, ad
sepes et vias. a. *a. Maria-di-Geri,
Portosolito, Paradiso, Russa* etc.

A maio ad augusti aetas.

— exaristata Bir.

In submontosis et demissis argilloso-
arenosis. *Canoletto.*

A junio ad septembrem. Nos adhuc
florentem januario vidimus.

— grandiflora Ten.

Ad viarum et agrorum margines her-
bosis. *Portosolito, a. Bartolomeo,
Fiscara* etc.

A maio ad julium.

Hysocris radiata L.

In herbosis ad vias et muros hinc
inde.

Per totum annum paucas floret.

— scabra L.

In campis siccis, et in collibus cal-
careis aridis, frequens.

A februario ad aprilum.

Seriola cretensis L.

In arvis, et campis herbosis, ad vias abvia,
Ab aprili ad junium.

Hypochaeris neapolitana D. C.

In pascuis apicis, ad sepes, et vias
herbosis haud raro.

Eodem tempore floret.

Catananche lutea L.

In campis, et collibus argillosis. *Mu-*

Iuna, Giunco, Soccorae.
Eodem tempore floret.

Cichorium Intybus L.

In argillosis, et calcareis ubique, et
ad fissuras rupium.
A majo ad junium.

— **divaricatum Schous.**

In pascuis, in incultis, et ad vias ubique.
Ab aprili ad junium.

Scolimus maculatus L.

In calcareis, et argillosis, ad vias
passim.
A junio ad augustum.

— **grandiflorus Guss.**

In herbosis apricis, et ad vias abunde.
A majo ad septembrem.

Kentrophyllum lanatum D. C.

In incultis et sterilibus, et ad vias.
A majo ad septembrem.

Carduncellus coerulescens D. C.

In argillosis locutis, et in arvis fre-
quens.
A majo ad julium.

— **tingitaneus Guss.**

In demissis et submontosis argillosis.
s. *Giocanti, Bidirimi.*
A majo ad . . .

— **pinnatus D. C.**

In campis maritimis. *Salvestroello,*
Montegna, Seltaggio.
Majo et junio.

Carlina lanata L.

In collibus incultis et ad vias satis
superque.

Julio et augusto.

— **sicula Ten.**

In arenosis et calcareis, ad vias.
Eodem tempore floret.

— **gummifera.**

In aridis sterilibus, et ad vias copiose.

Ab illibus julii ad octobrem.

Cynara horrida Ait.

In campis et collibus incultis aridis,
ac etiam ad vias.
Junio et julio.

Onopordon illyricum L.

In arenosis, et aridis, ad vias abunde.
Junio et julio.

Carduus corimbosus Ten.

In argillosis submontosis, ac demis-
sis, et ad vias. *Altobrando, Balchini,*
Maddalena.
Aprili et majo.

— **pymnocephalus L.**

In aridis sterilibus, ad vias abunde.
Eodem tempore fl.

— **argiroa Biv.**

In arvis apricis, ad vias frequens.
Eodem tempore.

— **cougestus Guss.**

In locutis, et sylvaticis, ac ad vias.
A majo ad junium.

Chaicus pungens Willd.

In humectibus, aqueosis, et ad vias, juxta
rivales, et ad torrentium ripas.
Tempio, Fontana-della-pietra, s. Ba-
stian, s. Pietro.

Junio et julio.

— **siculus Spreng.**

In palustribus, ad rivatorum margines
frequens.

A julio ad septembrem.

— **lanceolatus Willd.**

In sylvaticis, ad sepes et ad vias
campestres ubique.
Eodem tempore fl.

— **giganteus Willd.**

In sylvaticis et dumetis humidis fre-
quens.

A junio ad augustum.

Cnicus syriacus Willd.

In arvis, agris, et inter segetes frequens.

Maio et junio.

Leucea conifera D. C.

In declivitate montis Casauria prope s. Michele rara.

A maio ad . . .

Lappa minor D. C.

Ibidem.

Augusto.

Eupatorium cannabinum L.

In calcareis argillosis humectibus, et ad fossas,

A julio ad septembrem.

SUPERFLUA**Tanacetum vulgare L.**

Ad sepes, et margines agrorum haud rarum.

Junio et julio.

Artemisia arborescens L.

Cum praecedente, et eodem tempore floret.

Evax pygmaea Pers.

In collibus aridis et sterilibus. Crocedel-Vicario, Teatrino.

Maio.

— asteriscifolia Pers.

In collibus argillosis apricis. Malino-a-vento, Salcotorello.

Eodem mense fl.

— exigua D. C.

In collibus sterilibus calcareo-marais. Salcotorello, Montagna.

Aprili et maio.

Filago gallica L.

In campis urentis aridis. Moschetta, e. Bertolomco.

Aprili et maio.

Helichrysum rupestre D. C.

In collibus calcareis aridis. Salcotorello.

Maio et junio.

Senecio vulgaris L.

In campis, arvis, ruderalis, ad vias passim.

Floret fere per totum annum, sed praesertim hyemo et vern.

Senecio squalidus L.—var. b. chrysanthemifolius.

In arenosis inter vineas, in campis, et pascuis, ad vias ubique.

Floret fere per totum annum.

— lycopifolius Desf.

In argilloso-calcareis humectibus. Scaila, Russa, Pile.

Ab Augusto ad novembrem.

Chrysanthemum segetum L.

In campis et arvis herbosis nihil communius.

A martio ad majum.

— coronarium L.

In agris, inter segetes, ad viarum, et agrorum margines herbosos ubique.

Ab aprili ad junium.

var. Rosculis radii basi aureis, apice candidis.

In ruderalis herbosis. a. Roccarotara. Maio.

Matricaria chamomilla

Circum hortis usque spontanea. a.

Lorenzo, s. s. Caterina.

A martio ad idus maji.

Anthemis muricata Cass.

In collibus apricis argillosis. Malino-a-vento, Montagna.

Aprili et maio fl.

— incrassata Loïd.

In campis, et arvis, in cultis et in-

cultis ad vias ubique copiosè.
A februario ad julium, aliquè flare
usque ad octobrem.

Anthemis cotula L.

In prat. in campis, ad vias passim.
Ab aprili ad junium.

— *mixta* L.

In collibus aridis incultis et ad vias
non rara.

Eodem tempore fl.

Anacyclus tomentosus D. C. — var.

b. marginatus Guss.

In pascuis, et campis herbosis et ad
marginés viarum.
A martio ad junium.

Achillea ligustica All.

In incultis ad sepes, et marginés a-
grorum obvia.

A maio ad julium.

Tussilago farfara L.

In humentibus, et umbrosis demissis
vel submontosis. *Valle di Bardella*,
s. *Lorenzo, Tubuscio, s. Luigi, Orti-*
dell'acqua-nuova.

A decembri ad februarium.

Conyza squarrosa L.

In aridis, in sylvaricis, ad sepes
frequens.

Junio et julio.

— *scicula* Willd.

In demissis humatibus. *Piano delle-*
brucke, Margi, rara.

Ab idibus junii ad . . .

— *ambigua* D. C.

In aridis cultis et incultis, s. *sa Maria-*
di-Gesù, Luigi, Belmonte, et aliis.

A julio ad septembrem.

Conyza saxatilis L.

In rupibus marasae-calcareis. *Salento-*
relio, Montegau.

A februario ad julium.

Pulicaria odora Reich.

In campis et collibus apricis haud
rara.

Incuncto aestate.

Isula viscosa Ait.

In demissis sterilibus, et in collibus
aridis abunde.

A julio ad octobrem.

— *gravenlensis* Desf.

In campis siccis, vel demissis humi-
diusculis frequens.

Incuncto autumno.

Buphthalmum spinosum L.

In nostra planta foliis caulina sunt
semi-amplexicaulis; in reliquis ut
in *descript.* Cl. *Guss.* sed addo
albo-canescens in anthodii basi.

In arenosis et argillosis incultis, et
ad vias communè.

A maio ad augustum.

— *aquaticum* L.

In collibus argillosis, et in demissis
humidis. *Scala, Mazzone, Casculana.*

Maio et junio.

Bellis sylvestris Cyrill.

In pascuis, campis, collibus, ad vias
ubique.

A septembri ad majum.

— *hybrida* Tea.

In pascuis et campis apricis herbosis
et ad vias passim.

A decembri ad junium.

FRUSTRANEA

Centaurea melitensis L.

In calcareo argillosis frequens.

Ab aprili ad junium.

Centaurea napifolia L.

In collibus apricis aridis, et in campis
stercoribus haud rara.

A maio ad julium.

Centaurea lappacea Ten.

In arceosis aridis, et ad vias vulgaria.

A junio ad octobrem.

— **fuscata Desf.**

In campis et collibus, ac ad vias ubique.

A maio ad augustum.

— **calceitrapa L.**

In ruderalis, in campis, et ad vias

passim. Ineunte estate.

Centaurea salmantica L.

In argillosis frequens.

Eodem tempore floret.

Galactites tomentosa D. C.

In collibus apricis, in sylvaticis. ad margines agrorum.

Ab aprili ad julium.

NECESSARIA

Calendula arvensis L.

In arvis, et campis apricis herbosis, secus vias, inter opuntias et vineas satis superque.

A novembri ad junium

— **parviflora Raf.**

Cum precedente communis eodemque

tempore floret.

Calendula sicula Cyr.

In collibus marosis et calcareis herbosis. Montagna, Marcianino, s. la Chiera.

A decembri ad aprilem.

GYXANDRIA

Orchis decipiens Bianca.

In sylvaticis et dumetis aridis. s.

Basilio, Oghistro, s. Pietro.

Martio et aprili.

— **rubra Jacq.**

In collibus et submontosis sylvaticis.

Canavaria, s. Basilio, Russa, Mazzon, Selraggio.

Eodem tempore.

— **papilionacea L.**

Ibidem cum precedente, et eodem tempore floret.

— **pyramidalis Willd.**

In loculis humidiusculis submontosis. Tubosio.

Aprili et maio floret.

— **longicornu Poir.**

In sylvaticis submontosis. Canavaria. Maio adhuc florbat.

Orchis longibracteata Bie.

Recedit tantulum a descript. Cl. Guss.

foliis acutiusculis, petalis interioribus, nulla violacea macula punctatis, et labelis dorso glabris. Adde vera ovarium contortum.

In areosis sterilibus et incultis. Dirisa, Battistella, Russa, s. Basilio, Oghistro.

A januario ad martium.

— **undulatifolia Bie.**

In submontosis sylvaticis herbosis. Mazzon, Saretto-di-paltr, Regalsasco, s.

Battistello, Selraggio.

Aprili et maio.

Aceras andropogora Brown.

In submontosis frumentibus ad aquilonem. Sfere.

Martio et aprili.

Ophrys aranifera Huds.

var. *b. ambiguus* Tod.

O. inebriacea Bianca.

c. panormitana Guss.

d. limbata Reich.

In arenoso-calcareis herbidis et syl-
vaticis omnes haec varietates. Ta-
basio, Mizzione, Paradiso, Semini,
s. Barillo, Russa etc.

A martio ad majum.

— exaltata Ten.

In submontanis arenoso-calcareis. Ta-
basio, Paradiso, Ogliastro, Fon-
tanella.

Martio et aprilii.

— atrata Lindl.

In dumetis herbosis. Russa, s. Be-
rillo, Piano-di-Carbone.

Eodem tempore floret.

— tenthredinifera Willd.

In incolis herbosis et sylvaticis fra-
guens.

Eodem tempore floret.

— oxyrhynchus Tod.

In declivitate montis Cassaria ad
aquileum.

Aprilii floreat.

— lutea Cav.

var. *b. minor* Guss.

In ambabus varietatibus maculae duae

aequales in disco labellii; in var.

a. vero totidem puncti velutino-
pilosi a maculis procedentes in
ambitu luteo lobli intermedii.

In incolis sylvaticis, et herbosis fra-
guens.

Martio et aprilii.

Ophrys fusca Link.

In sylvaticis et incolis. Mazzone,
Paradiso, s. la Caterina.

Eodem tempore fl.

— pallida Raf.

Ibidem et s. Barillo.

Eodem tempore fl.

Serapias cordigera L.

In incolis graminosis, et in campis a-
priis, Tabasio, s. la Caterina.
Aprilii.

— lingua var. *b. L.*

In incolis arenoso-calcareis. Boech-
etto, s. la Caterina.

Martio et aprilii.

Listera ovata Brown.

In submontanis humiculis. Cassaria.

Nejo floreat.

Spiranthes autumnalis Rich.

In incolis humidis, et cespitosis.
Tabasio.

Incens autumnae.

ALEXANDRIA

Aristolochia rotunda L.

In submontanis calcareo-argillosis. Cas-
saria. *Gisotype*, Moschitta.

Aprilii et maji.

— longa L.

In sylvaticis argilloso-calcareis. Set-

roggio, Fontano-della-pietra.

Eodem tempore floret.

Aristolochia pallida Willd.

Differt a descript. Cl. Tenore quod
macula alio-purpurea corollae mi-
nime astat in fusca tubi, sed versans

apicem ligulae in interiori parte.
In submontosis argilloso-calcareis.

Casulana.
Aprili et maio.

MONOECIA

MONANDRIA

Cynomorium coccineum L.

Zannichellia palustris L.

In calcareo-arenosis-parasitica ad radicem Cisti-complicati. Refugio, Schiardi.
Majo.

In humidis, ad rivulos et stagna. s. Pietro, Margi.
Majo.

TRIANDRIA

Typha latifolia L.

Is frequens.

In palustribus, in fossis, ad stagna. Vigneta, Ponte-della-Rocca, Palle, Rangasile, et alibi.
Ab aprili ad junium.

Aprili et maio.

Carex Liukii Willd.

In campestribus et sylvaticis, ac ad sepes. s. Pietro.

— *angustifolia L.*

Invenit vere.

In fossis, ad stagna. s. Lorenzo, Maddalena, s. Pietro etc.
Eodem tempore.

— *serrulata Riv.*

In herbosis incolitis sterilibus apricis. s. Bartolomeo.

Sparganium ramosum Hud.

Eodem tempore.

Ad marginem torrentium et fluviorum, in fossis, et ad stagna. Tempio, s. Pietro.
Majo et junio.

— *maxima Scop.*

In stagnis, et ad fluminum ripas. Mazzarone, Tempio.
Eodem tempore.

Carex vulpina L.

In herbosis umbrosis et humidiuscu-

TETRANDRIA

Urtica urens L.

Ab aprili ad julium, et alicubi usque ad septembrem.

Ad macerios, in ruderalis obvia.
A novembri ad majum.

Urtica balearica L.

— *dioica L.*

In ruderalis, ad muros et pagos passim.
Aprili et maio.

Cum precedente, ac etiam ad sepes vulgatissima.

PENTANDRIA

Amaranthus sylvestris Desf.

Amaranthus albus L.

In cultis et incolitis frequens.
A julio ad octobrem.

In cultis et incolitis ac etiam ad vias ubique.
A julio ad octobrem.

Atriplex Halimus L.

In argillosis herbidis non rare.
Ab augusto ad . . .

Atriplex angustifolia Smith.

In cultis arenosis. *Ecuriales.*
A septembri ad octobrem.

POLYANDRIA

Arisarum vulgare Spreng.

In humidiusculis, ad sepes umbras
gregatim abunde.
A novembri ad aprillem.

Arum Italicum Mill.

In umbris humidibus, ad sepes
herbosas cum *Arisaro* communit.
Ineunte vera.

Theligonum Cynocrambe L.

Ad sepes umbras, in ruderalis et
saxosis herbida satis frequens.
A februario ad majum.

Poterium polygamum Wald. et Kit.

In calcareis cultis, ad sepes, et mar-
gines agrorum fere ubique.
Ab aprili ad majum.

Quercus Ilex L.

In nemoribus et sylvaticis. *Granieri*,
s. *Pietro*.

Aprili et maio.

Quercus Suber L.

In sylvaticis et nemoribus satis abunde,
inmo nemora, et sylvas con-
stituit cum *Fistacia Lentisco*, *Chamaerops humilis*, *Cistus Otia oleastro*,
etc.

Eodem tempore.

— *coccifera L.*

Non rara in nemoribus. s. *Pietro*,
Granieri, *Mazzerrone*.

Aprili et maio.

Platanus orientalis L.

Ad marginem fluminali s. *Pietro*.
Eodem tempore.

Corylus Avellana L.

Alieubi in humidis, sed passim culta.
Februario.

MONADELPHIA

Croton tiactorium L.

In arenoso-argillosis et calcareis pin-
guibus et cultis. *Semini*, *Fouan-
mel*, *Portosaleto*, *Russa*, *Tempio*, *Val-
le-de-molati* etc.
A junio ad septembrem.

Echolium elaterium Rich.

In pinguis, sterilibus, ruderalis,
incolis undique satis abunde.
Ab aprili ad junium.

Bryonia dioica Jacq.

In sylvaticis. s. *Pietro*.
Aprili maio.

DIOECIA

DIANDRIA

Salix pedicellata Desf.

In humicibus, ad torrentiam, et
fluviorum ripas. s. *Pietro*, *Mazzerrone*,
Granieri.

Januario.

Salix fragilis L.

Ibidem.
Februatio.

TRIANDRIA

Ostrya alba L.

In arenosis, et calcareo-argillosis syl-

vaticis ad sepes, et circa vias abvia.

Ab aprili ad julium.

PENTANDRIA

Pistacia Lentiscus L.

In sylvaticis et nemoribus abunde, et

etiam ad sepes dumetos viarum meridionalium.

A martio ad majum.

— vera *L.*

In rupibus calcareis. Belladonna.

Foras olim culta.

Aprili et maio.

Humulus Lupulus L.

In dumetis et sepihus humanitibus.

Consuetudo.

Julio.

HEXANDRIA

Smilax aspera L.

In calcareis ad sepes crispulosas, et

in dumetis. Montagna. Marcunino, a. Basilio, Nocer, etc.

Septembris et octubris.

Smilax mauritanica Desf.

Cum precedente, et magis frequens

in sylvaticis, et dumetis.

Eodem tempore flores.

OCTANDRIA

Populus alba L.

In humenibus sylvaticis, circum aquas

fluentes, ac ad sepes frequens.

Incute vere.

— tremula *L.*

In dumetis et nemoribus meridiana-

libris non rara.

Incute vere.

Populus nigra L.

In dumetis, et sylvaticis ac ad sepes

passim.

Eodem tempore flores.

ENNEANDRIA

Mercurialis annua L.

In cultis et iaculis umbrosis, et

humidis, nec non in roderatis et ad

rupos. Refugio, Battistello, a. Monro, Montagna, Orti-dell'-acqua-nuova, e di-Nazzi-recchi etc.

Fere per totum annum flores.

var. β . Folia lanceola-

tis! Nob.

An M. ciliata Presl? sed in ista

folia sunt cordato-ovata.

Hanc nostram observationem Cl.

Gussone placuit retinere.

In areoso-argillosis. Via-di-Fontanelle, sotto la-villa-di-Pam, rara, nec alibi usque adhuc vidimus.

MONADELPHIA

Juniperus phoenicea L.

In nemoribus. s. Pietro, Granieri.
Novembri et decembri.

Ruscus aculeatus L.

In sylvaticis, in dumetis, et ad sepes.
Paradiso, Mazzone, s. Pietro, et
alibi.

A februario ad aprilum.

POLYGAMIA

MONOGECIA

Valantia muralis L.

In ruderalis graminosis non rare.
A martio ad majum.

Parietaria diffusa Mart. et Koch.

In ruderalis, circum aquas lente fluen-

tes, et ad muros.

Flaret fere per totum annum.

Parietaria lusitanica L.

Eodem — Fl. a januario ad martium.

DIOECIA

Ceratonia siligua L.

In calcareo-arenosis. Passo-di-Cristo-
fero, s. Pietro, rara.

Incoate autumn.

Ficus carica-sylvestris L.

In sylvaticis, ad sepes et muros
obvia.

Majo et junio.

Chamaecrops humilis L.

In nemoribus, et sylvaticis meridie-
nalibus perabundat.

Martio et aprili.

CRYPTOGAMIA

Equisetum ramosissimum Desf.

In humilis calcareo-argillosis a-
bundat.

A januario ad junium.

— *fluviale* L.

In uliginosis, ad rivulos et ad tor-
rentium margines.

Incoate vere.

Osmunda regalis L.

In submontosis calcareo-argillosis.

Caneaia.

Majo.

Gymnogramme Ceterach Spr.

In saxosis umbris, ad muros hu-
midiusculos, ad fissuras rupium
et ad radices arborum in sylvaticis.

Dicis, Noce, s. Mauro, Mazzo-
ne etc.

A januario ad martium.

Polypodium vulgare L.

Ad radices arborum in sylvaticis hu-
midiusculis, ad rupes equineum
spectantibus. Madonna-della-cia,
Mazzone, s. Eustio et alibi.

A februario ad aprilem.

Scolopendrium officinale Swartz.

In umbris humidis. *Cansaria.*

Aprili.

— *Hemionitis Swartz.*

In antris equum stillantibus. *Cansaria, Grotta-delle-Minelle presso s. Michele, s. Bartolomeo.*

Aprili et maio.

Pteris aquilina L.

In fruticetis umbrosis, et ad sepes sylvaticos.

Augusto et septembri.

Adiantum Capillus-Veneris L.

Ad aquarum potabilium scaturigines.

Ab aprili ad junium.

Asplenium Trichomanes L.

Ad muros humidos, in fissuris rupium, et ad radices arborum in sylvaticis.

A martio ad junium.

Asplenium Adiantum-nigrum L.

In calcareis submontosis, et in picturis.

A martio ad junium.

Athyrium filix-foemina Roth.

In sylvaticis. s. *Pietro, Granieri.*

Aprili et maio.

Aspidium filix-mas. Swartz.

In submontosis humestibus et umbrosis.

Junio.

— *pallidum Bory.*

Ad rupes calcareas. *Montagna, Cansaria.*

A februario ad junium.

Tuber cibarium Pers. ex Targ.

In sylvaticis arenoso-calcareis. s. *Pietro, Cansaria.*



DABANTUR HODIE XV JULII MDCCCXIV

FINIS PRIMI FASCICULI.

